

Loyant™ PILIHAN YANG TERBAIK KARENA:



Spektrum Luas Termasuk Untuk Gulma yang Sulit Dikendalikan




Echinochloa crus-galli




Monochoria vaginalis



Spenochlea zeylanica



Ludwigia octovalvis



Fimbristylis miliacea



Cyperus difformis



Cyperus iria



Bekerja 2 kali lebih cepat

- Golongan Daun Lebar (0.5 – 1 hari)
- Golongan Rumputan (1 – 3 hari)
- Golongan Tekian (3 – 5 hari)



Hemat Biaya

Tidak perlu matut dan tidak perlu semprot berkali-kali

CARA MENGGUNAKAN Loyant™ UNTUK HASIL TERBAIK

Waktu Penggunaan



2-3 helai daun gulma
(10-14 HST)

Dosis



Gunakan **Loyant™**
1 Liter/Hektar

Tepat Cara



kondisi
macak-macak
saat aplikasi

airi lahan
2 HSA, 3-5 cm
selama 7 hari

gunakan
Nosel Kipas

Untuk Gulma Timunan/Dengkulan/Ace Ace Gunakan Clincher 100 EC

Clincher™ 100 EC

HERBISIDA



Timunan/Dengkulan/Ace-ace
Leptochloa chinensis



Dosis dan Waktu Aplikasi



5 Botol: 800ml-1000ml/1 Hektar

1 Hektar
Lahan
Padi

Aplikasikan **Clincher™ 100 EC**
pada umur padi 10 - 15 HST (Stadia 3 - 5 Daun Gulma)

Loyant™ 25 EC

Rinskor™ active

HERBISIDA

“Panen Terjaga,
Hidup Sejahtera”



TAHUKAH ANDA?

Penyerapan pupuk
menjadi tidak optimal

Biaya tenaga kerja
matun semakin sulit
dan biaya semakin
tinggi

Kompetisi gulma
menyebabkan potensi
PANEN berkurang
10 -15 % bahkan bisa
kehilangan hasil dapat
mencapai 86% jika
tanpa pengendalian
gulma (Jurnal Agro
Indonesia, 2016)

Jaga Potensi Hasil
Anda Dengan
Loyant™

Waktu dan Dosis Pemakaian Loyant™ Untuk Hasil Terbaik

Gunakan Loyant™ pada saat
Gulma 2-3 helai daun atau
umur pada 10 - 14 Hari
Setelah Tanam



Dosis :
1 L/Ha atau 2 Botol per Ha



HST
(Hari
Setelah
Tanam)

0

10

14

28

42

56

Pembentukan Daun

Anakan Aktif

Pembentukan Malai

Bunting

Tahap Penting Dalam
Menjaga Pertumbuhan Padi



Terbukti Lebih Cepat
Lahan bersih, bebas dari gulma.
Novlect™ bekerja sejak hari pertama

Terbukti Lebih Tuntas
Hemat aplikasi dan biaya

Terbukti Potensi Hasil Lebih Terjaga

