

ProClova – Der Champion im Grünland mit Klee

- Breites Wirkspektrum bei gleichzeitiger Kleeschonung
- Starke Wirkung auf Doldenblütler (z.B. Wiesenkerbel)
- Exzellente Verträglichkeit für Gräser
- Anwendung während der gesamten Vegetationsperiode möglich



Weitere Info

Zugelassen zur: Flächenanwendung

ProClova – stark gegen Unkräuter und kleeschonend

ProClova zeichnet sich neben seinem breiten Unkraut-spektrum auch durch seine sehr gute Verträglichkeit auf Gräser und seine Kleeschonung aus. Daher kann ProClova in Beständen mit etablierten Weißklee- und Rotkleeanteil eingesetzt werden. Auftretende Wuchsbeeinträchtigun-gen des Klees nach der Anwendung sind nur vorrüber-gehend. Diese verwachsen sich schnell und der Klee kann sich ohne Unkrautkonkurrenz besser entwickeln.



Weißklee
(Trifolium repens)



Rotklee
(Trifolium pratense)

Wirkungsspektrum ProClova* in Neuansaat


Unkräuter	Wirksamkeit
Ampfer-Arten	■ ■ ■ ■
Hundspetersilie	■ ■ ■ ■
Knöterich, Vogel-	■ ■ ■
Knöterich, Winden-	■ ■ ■
Gänsefuß-Arten	■ ■ ■ ■
Hirtentäschel	■ ■ ■ ■
Hellerkraut	■ ■ ■ ■
Kamille-Arten	■ ■ ■
Vogelmiere	■ ■ ■
Einjähriges Bingelkraut	■ ■ ■
Amarant	■ ■ ■
Taubnessel-Arten	■ ■ ■ ■
Storchschnabel-Arten	■ ■ ■ ■
Löwenzahn	■ ■ ■ ■
Hundskerbel	■ ■ ■ ■

Klee steigert den Wert des Grünlands



Fängt Luftstickstoff ein,
die Bodenfruchtbarkeit
wird erhöht

+



Erhöhtes Rohprotein
und bessere Verdaulichkeit
des Grundfutters

+



Mehr und
wertvollerer Ertrag
vom Grünland

=



Erhöht
die Rendite

Unschlagbare Tiefenwirkung!

Simplex™

HERBIZID

- Tiefenwirksame Breiten- und Dauerwirkung
- Überraschende Wirkung auf perennierende Arten (Disteln)
- Stark gegen Kreuzkäter (z.B. Jakobskreuzkraut)



Weitere Info

Zugelassen zur: Flächenanwendung, Einzelpflanzen- und Horstbehandlung, Streichverfahren (z.B. Rotowiper)

Diese Auflagen sind zu beachten:

- Nur auf Dauerweide oder nach dem letzten Schnitt
- Wirtschaftsdünger und Futter bleiben im eigenen Betrieb
- Wirtschaftsdünger nur auf Grünland zu Getreide oder Mais

Höchstleistung im Grünland

Ranger™

HERBIZID

- Breitenwirkung – Ampfer und mehr
- Breites Anwendungsfenster
- Erfolgreiche Nachsaat durch Breitenwirkung



Weitere Info

Zugelassen zur: Flächenanwendung, Einzelpflanzen- und Horstbehandlung, Streichverfahren (z.B. Rotowiper)



Corteva Agriscience Germany GmbH
Riedenburger Str. 7 | 81677 München

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Warnhinweise und -symbole beachten.

Bilder: Riko Best, Cora Müller, marina kuchenbecker, Andrey Zyk,
Pielica, Macowi (raspurneko (stock.adobe.com)), Corteva,
Irrtum und Druckfehler vorbehalten, Stand: November 2025

Nachhaltige Unkraut-kontrolle im Grünland



corteva.de

™ ® Markenrechtlich geschützt von Corteva Agriscience
und Tochtergesellschaften. © 2025 Corteva.



ProClova®

Rinskor™ active

HERBIZID

Eine breite Wirksamkeit gegen Unkräuter mit gleichzeitiger Kleeschonung war bis heute im Bereich der Grünlandherbizide ausgeschlossen. Das ändert sich jetzt mit ProClova, das sich neben seinem breiten Unkrautspektrum auch durch seine Kleeschonung auszeichnet. ProClova beinhaltet den neuen Wirkstoff Rinskor active aus der Klasse der synthetischen Auxine (HRAC 4), mit dem Unkräuter schnell und nachhaltig kontrolliert werden.

Produktprofil

Kulturen:
Wiesen und Weiden
Wirkstoffe (Gruppe):
60 g/kg Rinskor active (4)
360 g/kg Amidosulfuron (2)
Formulierung:
Wasserdispersgierbares Granulat (WG)
Abstandsauflagen:
125 g/ha:
NT 102-1, NW 605-2, NW 606
85 g/ha:
NT 101-1, NW 605-2, NW 606
Verkaufsgebinde:
0,25 kg + 0,5 l Netzmittel
0,5 kg + 1 l Netzmittel



Anwendungsempfehlung

Wiesen und Weiden*

125 g/ha ProClova + 0,25 l/ha ProClova Netzmittel

Ansaatjahr**

85 g/ha ProClova + 0,17 l/ha ProClova Netzmittel

Jan

Feb

Mär

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dez

* Etabliertes Grünland = mehr als 90 % Bodenbedeckung oder älter als ein Jahr

** BBCH 21 – 39 der Kultur



Gut zu wissen

Kleearten binden Stickstoff aus der Atmosphäre. Dabei kann als Faustformel angenommen werden, dass 1 % Ertragsanteil bis zu 3 kg/ha Luftstickstoff bindet

Kleearten besitzen eine hohe Regenerationsfähigkeit und schließen freiwerdende Lücken im Bestand schnell

ProClova ist als nicht bienen-gefährdend (B4) eingestuft



Wirkungsspektrum Grünlandherbizide

Deutscher Name	Lateinischer Name	Simplex™ HERBIZID 2,0 l/ha	Ranger™ HERBIZID 2,0 l/ha	ProClova® Rinskor™ active HERBIZID 125 g/ha + 0,25 l/ha
Ampfer-Arten	Rumex spp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Bärenklau, Wiesen-	Heracleum sphondylium	■	■ ■	■ ■ ■ ■
Beinwell, Gewöhnlicher-	Symphytum officinale	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	n.b.
Brennnessel, Arten	Urtica spp.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Distel-Arten	Cirsium spp., Carduus spp.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■	■
Ferkelkraut, Gemeines-	Hypochaeris radicata	■ ■ ■ ■	n.b.	n.b.
Fingerkraut, Kriechendes-	Potentilla reptans	■ ■ ■ ■	■ ■	n.b.
Flockenblume	Centaurea spp.	■ ■ ■ ■	■	■ ■
Gänseblümchen	Bellis perennis	■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Gänsedistel	Sonchus arvensis	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Giersch, Zaun-	Aegopodium podagraria	■ ■	■ ■ ■ ■	n.b.
Hellerkraut	Thlaspi anense	■ ■	■	■ ■ ■ ■
Hirtentäschel	Capsella bursa-pastoris	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Hornkraut, Kleinblütiges-	Cerastium glomeratum	■ ■	n.b.	■ ■ ■ ■
Huflattich	Tussilago farfara	■ ■ ■ ■	■ ■	n.b.
Johanniskraut	Hypericum perforatum	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	n.b.
Kälberkropf, Behaarter-	Chaerophyllum hirsutum	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Kamille-Arten	Matricaria spp.	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Kerbel, Wiesen-	Anthriscus sylvestris	■ ■ ■ ■	■	■ ■ ■ ■
Klee-Arten	Tritolium spp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	-
Klette, Große-	Arctium lappa	■ ■ ■ ■	■	n.b.
Knöterich, Japanischer Stauden-	Fallapia japonica	■ ■ ■ ■	■	■
Knöterich, Landwasser-	Polygonum amphibium	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
Knöterich, Sachalin-	Reynoutria sachalinensis	■ ■	■ ■	■ ■
Knöterich, Wiesen-	Polygonum bistorta	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Königskerze	Verbascum spp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	n.b.
Krapp, Levantiner-	Rubia perigrina	■ ■ ■ ■	n.b.	n.b.
Leinkraut, Neiken-	Silene armeria	■ ■ ■ ■	■ ■	n.b.
Löwenzahn, Gemeiner-	Taraxacum officinale	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Luzerne	Medicago spp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■
Minze, Acker-	Mentha arvensis	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Pestwurz	Petasites hybridus	n.b.	■ ■	n.b.
Pippau, Borsten-	Crepis setosa	■ ■ ■ ■	n.b.	■
Radmelde, Besen-	Kochia scoparia	■ ■ ■ ■	n.b.	n.b.
Rainfarn	Tanacetum vulgare	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	n.b.
Sauerklee	Oxalis spp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	n.b.
Schafgarbe, Gemeine-	Achillea millefolium	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Storchschnabel, Wiesen-	Geranium pratense	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Taubnessel, Weiße-	Lamium album	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Vergissmeinnicht, Acker-	Myosotis arvensis	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■
Vogelmiere	Stellaria media	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Wasserfenchel, Bibernelle-	Oenanthe pimpinelloides	■ ■	n.b.	n.b.
Wegerich-Arten	Plantago spp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Weidenröschen	Epilobium spp.	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	n.b.
Wicke-Arten	Vicia spp.	■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■	-
Wiesenlabkraut	Galium album	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Wiesenmargerite	Chrysanthemum leucanthemum	■ ■ ■ ■	n.b.	n.b.
Wilde Möhre	Daucus carota	■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Zaunwinde	Calystegia sepium	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Ziest, Acker-	Stachys arvensis	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Giftpflanzen				
Adlerfarn	Pteridium aquilinum	■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Bärenklau, Riesen-	Heracleum mantegazzianum	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Hahnenfuß, Kriechender-	Ranunculus repens	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Hahnenfuß, Scharfer-	Ranunculus acris	■ ■ ■ ■	■ ■	■ ■ ■ ■
Herbstzeitlose	Colchicum autumnale	n.b.	■ ■	n.b.
Kreuzkraut, Jakobs-	Senecio jacobaea	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Schachtelhalm, Acker-	Equisetum arvense	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Scharbockskraut	Ranunculus ficaria	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Wiesenschaukraut	Cardamine pratensis	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
Wolfsmilch, Zypressen-	Euphorbia cyparissias	■ ■ ■ ■	n.b.	n.b.

Die Bekämpfung von einjährigen Samenunkräutern sollte im Jugendstadium / vor Blühbeginn erfolgen.

- ■ ■ ■ = Ausgeprägte Dauervirkung
- ■ ■ ■ = Sehr gute bis gute Wirkung
- ■ ■ ■ = Weniger gute Wirkung
- ■ ■ ■ = Nicht ausreichende Wirkung

n.b. = keine Daten vorhanden



Brennessel (Urtica dioica)



Wiesenkerbel (Anthriscus sylvestris)



Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea)



Distel (Cirsium arvense)