

VADEMECUM 2026

Brochure Insecticide Herbiciden Maïs

Lortama™

NEW

Dragster™

NEW



CORTEVA™
agriscience

Inhoudstafel

Samenstelling van alle herbiciden & insecticide in maïs	p. 3
Insecticide Sherpa 0.8 GR	p. 4 - 5
Het Corteva-gamma herbiciden in maïs	p. 6 - 15
LORTAMA	p. 6 - 7
DRAGSTER	p. 8 - 9
KART ATACO	p. 10 - 11
TREVISTAR	p. 12 - 13
MATRIGON	p. 14
TITUS	p. 15



Insecticiden & Herbiciden maïs

Samenstelling van Sherpa 0.8 GR en alle herbiciden in deze brochure

PRODUCT	SAMENSTELLING	ERKENNING
SHERPA 0,8 GR	8 g/kg cypermethrine	10104P/B
ATACO	1 g/l florasulam + 100 g/l fluroxypyr	9508P/B
DRAGSTER	148,15 g/kg rimsulfuron + 92.6 g/kg thifensulfuron-methyl + 111,11 g/kg isoxadifen-ethyl	34611P/B
KART	1 g/l florasulam + 100 g/l fluroxypyr	9463P/B
LORTAMA	40 g/l nicosulfuron + 3.97 g/l florpyrauxifen -benzyl + 9.64 g/l thifensulfuron -methyl + 9.05 isoxadifen-ethyl	31930 P/B
MATRIGON	100 g/l Clopyralid	8200 P/B
TITUS	250 g/kg rimsulfuron	8334P/B
TREVISTAR	2.5 g/l florasulam + 100 g/l fluroxypyr + 80 g/l clopyralid	9799 P/B



De oplossing tegen bodeminsecten

Sherpa™ 0.8GR

Granulaat tegen ritnaalden

Ritnaalden zijn de meest schadelijke bodeminsecten in maïs

Een aantasting van ritnaalden kan nefaste schade veroorzaken tussen kieming en het 4-bladstadium met dus ernstige opbrengstverliezen tot gevolg

Na dit stadium is de maïs voldoende sterk om een eventuele aantasting te weerstaan

De levenscyclus van de ritnaald is meerjarig

Schade kan gedurende meerdere teeltseizoenen voorvallen

SHERPA bevat cypermetrine onder de vorm van een microgranulaat, met een contact- en maagwerking.

SHERPA is toegelaten in maïs, aardappelen, koolzaad, wortelen en enkele groentegewassen (zie etiket).


SHERPA heeft een gunstig milieuprofiel: hij produceert geen stof, geen drift, is geurloos en weinig oplosbaar in water en dus weinig afhankelijk van de bodemcondities, efficiënt onder droge en vochtige omstandigheden.

SHERPA beschermt de maïs in een jong stadium (kieming tot 4 blad) op voorwaarde dat de verdeling in de zaairij optimaal en regelmatig is.

Dosis in maïs 12 kg/ha


IN MAÏS : QDC-DXP VERDELER

De toepassing gebeurt met specifieke verdelers die ervoor zorgen dat de verdeling homogeen en rond het zaad gebeurt. De oplosbaarheid en herverdeling van het product in de bodem na de toepassing is zeer beperkt. Een precieze toepassing is dus aangeraden.



Deze verdelers zijn gratis en te verkrijgen bij uw verdeler

Levenscyclus ritnaald *Agriotes lineatus*



Zware ritnaaldaantasting in maïs



LORTAMA op basis van **nicosulfuron + Rinskor + thifensulfuron + safener**

Oplossing met een zeer breed werkingsspectrum tegen grassen en éénjarige breedbladige onkruiden

Rinskor®Active is de commerciële naam van de molecule florpypyrauxifen

LORTAMA introduceert een nieuwe molecule voor de onkruidbestrijding in maïs, « **Rinskor Active** » met een nieuwe werkwijze.

Rinskor is de tweede vertegenwoordiger binnen de groep van de arylpicolinen (HRAC, groep 4), een groeistof efficiënt bij heel lage dosis en reeds bij lage temperatuur met een snelle werking op breedbladige onkruiden.

Rinskor heeft de werking van een groeistof die de vorming van ALS-resistentie van breedbladige onkruiden vertraagt.

LORTAMA bestrijdt ALS-gevoelige grassen in een jong stadium.

Zeer gevoelige grassen : windhalm, hanepoot, raaigras, straatgras, duist, naaldaar.

Matig gevoelige grassen : harig vingergras en glad vingergras

LORTAMA beschikt een heel breed werkingsspectrum op breedbladige onkruiden waaronder ook zuring.

Zeer gevoelige breedbladige onkruiden : amarant, uitstaande melde, kamille, melganzevoet, herderstasje, klapproos, kruisbloemigen, doornappel, reigersbek, duivekervel, knopkruid, ooievaarsbek, dovenetel, bingelkruid, muur, viooltje, ereprijs in jong stadium, varkensgras, perzikkruid, zuring.

Matig gevoelige onkruiden : distel, melkdistel, haagwinde en akkerwinde.

LORTAMA is toegelaten in korrel- en kuilmaïs tussen 2- en 8 blad (BBCH 12-18).

LORTAMA is een systemisch bladherbicide, kant-en-klare OD formulering die snel werkt op grassen.



Hanepoot



Melganzevoet



Doornappel



Ooievaarsbek

LORTAMA is een OD formulering mengbaar met bodem- en contactherbiciden.

LORTAMA wordt bij voorkeur toegepast op jonge onkruiden met een actieve groei (vochtige bodem, groeizaam weer). Rinskor biedt de mogelijkheid om een goed resultaat te boeken op meldes en het werkingsspectrum te versterken op enkele moeilijke breedbladige onkruiden.

LORTAMA is een contactmiddel met weinig nawerking in de bodem.

Vermijd een toepassing van **LORTAMA** op maïs onder stress: droogtestress, onder water, lage temperatuur (nachtvorst).

Risicobeperkende maatregelen, bufferzone van 20 m tov oppervlaktewater met een driftreducerende techniek van 75% .

Bestrijding van moeilijke grassen - vingergrassen

LORTAMA heeft een matige efficiëntie op vingergrassen, een combinatie van **LORTAMA + DRAGSTER / TITUS** geeft een beter resultaat dan de middelen afzonderlijk.

Bestrijding van haagwinde

LORTAMA is weinig efficiënt op haagwinde, een combinatie **LORTAMA + KART / ATACO** of **TREVISTAR** versterkt het systeem op haagwinde.

Programma's met LORTAMA

Schema MET TBA Bodemherbicide + Contactherbicide + LORTAMA 1 l/ha	+ KART/ATACO of TREVISTAR op meerjarige zoals haagwinde, aardappelopslag ...
Schema ZONDER TBA Bodemherbicide + Contactherbicide + LORTAMA 1 l/ha	
Schema ZONDER TBA op moeilijke grassen Bodemherbicide + Contactherbicide + LORTAMA 1 l/ha + DRAGSTER 135 g/ha	

DRAGSTER op basis van rimsulfuron + thifensulfuron + safener

Oplossing met een brede werking tegen grassen en éénjarige breedbladige onkruiden

DRAGSTER bevat rimsulfuron (Titus) & thifensulfuron, bestrijdt breedbladige onkruiden & ALS-gevoelige grassen in een jong stadium.

Zeer gevoelige grassen : windhalm, hanepoot, straatgras, raaigras, naaldaar, duist.

Matige gevoelige grassen : glad vingergras en harig vingergras

Zeer gevoelige breedbladige onkruiden: amarant, uitstaande melde, kamille, herderstasje, melganzevoet, klaproos, kruisbloemigen, knopkruid, ooievaarsbek, doventel, muur, varkensgras, perzikkruid, zuring, viooltje.

Matig gevoelige breedbladige onkruiden : doornappel, melkdistel, nachtschade, bingelkruid, haagwinde, akkerwinde.

DRAGSTER is toegelaten in korrel- en kuilmaïs en bevat een safener die hem selectief maakt in maïs vanaf stadium 1 tot 8 blad (BBCH 11-18).

DRAGSTER is een systemisch bladherbicide, kant-en-klare WG-formulering zonder adjuvanten. Daarom wordt **DRAGSTER** steeds in combinatie gebruikt met VIVOLT of KART/ATACO om te profiteren van het « booster » effect van deze producten.

DRAGSTER is compatibel met contact- en bodemherbiciden.

DRAGSTER is een product op basis van 2 sulfonylurea (ALS), om een goed resultaat te bekomen geef de voorkeur aan een behandeling op jonge onkruiden met actieve groei (vochtige bodem, groeizaam weer).

DRAGSTER is een contactmiddel met weinig nawerking in de bodem.

Vermijd een toepassing van **DRAGSTER** op maïs onder stress: droogtestress, onder water, lage temperatuur (nachtvorst).

Risicobeperkende maatregelen : bufferzone van 20 m tov oppervlaktewater met driftreducerende techniek van 90%.

Bestrijding van moeilijke grassen – vingergrassen

DRAGSTER is matig efficiënt op vingergrassen, een combinatie **DRAGSTER + LORTAMA** geeft een beter resultaat dan de producten afzonderlijk.

Bestrijding van haagwinde

DRAGSTER is weinig efficiënt op haagwinde, een combinatie **DRAGSTER + KART / ATACO** versterkt de werking op haagwinde

Programma's met DRAGSTER

Schema MET TBA Bodemherbicide + contactherbicide + DRAGSTER 135 g/ha	
Schema ZONDER TBA Bodemherbicide + Contactherbicide + DRAGSTER 135 g/ha	+ KART/ATACO op éénjarigen of + KART/ATACO 0.75 L op meerjarigen zoals haagwinde, aardappelopslag ...
Schema ZONDER TBA op moeilijke grassen Bodemherbicide + Contactherbicide + DRAGSTER 135 g/ha + LORTAMA	



Hanepoot



Harig vingergras



Naaldaar



Glad vingergras

Kart Ataco™

*KART ATACO op basis van **florasulam + fluroxypyr***

Zeer efficiënt tegen zwaluwtong en haagwinde

KART ATACO versterken het klassieke werkingsspectrum op haagwinde, zwaluwtong, aardappelopslag ...

Beide zijn heel selectief op alle maïsvariëteiten.

KART ATACO zijn een SE-formulering (suspo emulsie) die een verzekerd resultaat geeft.

Bestrijding van haagwinde

KART ATACO in menging met een klassiek schema bestrijdt perfect de aanwezige haagwinde.

Een tweede behandeling met **KART ATACO** is aan te raden 10-15 dagen later om later opkomende haagwinde te bestrijden.

Bestrijding van aardappelopslag

KART ATACO zijn heel sterk op aardappelopslag

- Bij een regelmatige opkomst van de aardappelopslag: klassiek schema + **KART ATACO**
- In het geval van later opkomende opslag : herbehandel met **KART ATACO** of **STARANE FORTE** voor het 7-blad stadium

Bestrijding van zwaluwtong

Indien een schema zonder TBA (terbuthylazine) wordt toegepast, zien we een verlies in bestrijding met 50% op zwaluwtong.

De toevoeging van **KART ATACO** maakt het mogelijk een perfect resultaat te behalen zelf zonder TBA in het schema.

BOOSTER van alle onkruidbestrijdingsschema's

Ofwel in 1 enkele behandeling met of zonder TBA, maïs in 3-4 blad

Ofwel in 2 behandelingen, met of zonder TBA, maïs in 3 blad en herhalen in 5-6 blad van de maïs


TBA risicobeperkende maatregelen

Bufferzone 20 m met driftreducerende techniek van min. 75%

Max. 1 toepassing met een product op basis van TBA/36 maanden en max. 750 g actieve stof TBA/ha/36 maanden

Programma's met KART ATACO

Schema MET TBA Bodemherbicide + contactherbicide + LORTAMA of DRAGSTER	+ KART ATACO 0,5 tot 0.7 L op éénjarigen + KART ATACO 0,7 L gevolgd door 0,5 L op haagwinde
Schema ZONDER TBA Bodemherbicide + contactherbicide + LORTAMA of DRAGSTER	+ KART ATACO 0,75 L op éénjarigen en meerjarigen + KART ATACO 0,7 L gevolgd door KART ATACO 0,5 L op haagwinde



Zwaluwtong



Perzikkruid



Haagwinde



Aardappelopslag

TREVISTAR op basis van **florasulam + fluroxypyr + clopyralid**

Heel breed werkingsspectrum op éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden

TREVISTAR vergroot het werkingsspectrum van de klassieke schema's op haagwinde, zwaluwtong, aardappelopslag, distel, opslag van ALS 2 cichorei ... Heeft een uitstekende selectiviteit op alle maïsvariëteiten.

TREVISTAR is een EC formulering die gemengd kan worden met alle klassieke herbiciden.

Bestrijding van haagwinde

TREVISTAR in menging met een klassiek schema bestrijdt perfect de aanwezige haagwinde.

Een tweede bespuiting met **TREVISTAR** is aangeraden 10-15 dagen later om later opkomende haagwinde te bestrijden.

Bestrijding van distels en opslag van ALS 2 cichorei

TREVISTAR wordt ingezet op meerjarigen in een jong stadium : distel 10-20 cm & cichorei in rozetstadium.

TREVISTAR werkt heel sterk in op de wortels van de meerjarigen.

- Bij een regelmatige opkomst van cichorei-opslag: klassiek schema + **TREVISTAR**
- In geval van later opkomende planten, behandel met het saldo van **TREVISTAR** voor het 7-blad stadium van de maïs of **MATRIGON**

Bestrijding van zwaluwtong

Indien een schema zonder TBA (terbuthylazine) wordt ingezet, zien we een verlies in efficiëntie van 50% op zwaluwtong.

De toevoeging van **TREVISTAR** geeft een perfect resultaat op zwaluwtong zelfs zonder TBA in het schema.

BOOSTER van alle onkruidbestrijdingsschema's

Ofwel in 1 enkele behandeling, met of zonder TBA, maïs in 3-4 blad
Ofwel in 2 behandelingen, met of zonder TBA, maïs in 3 blad en een herhaling op maïs in 5-6 blad

TBA risicobeperkende maatregelen


Bufferzone 20 m met driftreducerende techniek van min. 75%

Max. 1 toepassing met een product op basis van TBA/36 maanden en max. 750 g actieve stof TBA/ha/36 maanden

Programma's met TREVISTAR

TREVISTAR is een complete formulering die clopyralid bevat, die het werkings-spectrum versterkt op éénjarigen en meerjarigen zoals cichorei-opslag, alle distels en melkdistels, ontwikkelde kamille, ...

Schema MET TBA Bodemherbicide + Contactherbicide + LORTAMA of Bodemherbicide + Contactherbicide + Grassenmiddel	+ TREVISTAR 0,5 L op éénjarigen + TREVISTAR 0,5 -0.75 L op meerjarigen zoals haagwinde, aardappelopslag en ALS 2 cichorei opslag ...
Schéma ZONDER TBA Bodemherbicide + Contactherbicide + LORTAMA of Bodemherbicide + Contactherbicide + Grassenmiddel	+ TREVISTAR 0.5-0,75 L op gevarieerde flora van één- en meerjarigen



MATRIGON op basis van clopyralid

Efficiënt op meerjarige composieten

MATRIGON vergroot het werkingsspectrum van de klassieke schema's op meerjarige composieten: akkerdistel, meerjarige melkdistel, kamille-opslag en ALS 2 cichorei-opslag, witloofopslag, hoefblad.

MATRIGON is heel selectief in maïs vanaf stadium 6-blad tot 9-blad (BBCH 16-19).

MATRIGON is een SL-formulering compatibel met alle klassieke herbiciden.

MATRIGON wordt toegepast met een koolzaadolie indien een specifieke toepassing.

Bestrijding van ALS 2 cichorei-opslag en distel

MATRIGON wordt toegepast bij meerjarigen in en jong stadium : distel 10-20 cm & cichorei in rozetstadium .

MATRIGON werkt heel sterk in op de wortels van meerjarigen.

MATRIGON wordt gespoten met een volume van 200 L en bij een RV > 70 %.

- Op distel, één enkele behandeling : klassiek schema + **MATRIGON 1 L/ha**
- Indien regelmatige opkomst van cichorei-opslag : klassiek schema + **MATRIGON 0.75 L/ha**
- Indien later opkomende cichorei-opslag, herbehandel met **0.75 L/ha MATRIGON** + olie



Kamille-opslag



Distels

TITUS op basis van rimsulfuron

Efficiënt op éénjarige grasonkruiden

TITUS bevat rimsulfuron, bestrijdt ALS-gevoelige grassen & bepaalde breedbladige onkruiden in een jong stadium.

Zeer gevoelige grassen: windhalm, duist, hanepoot, naaldaar, straatgras, raigras.

Matig gevoelige grassen : glad vingergras en harig vingergras

Gevoelige breedbladige onkruiden : amarant, kamille, herderstasje, melganzevoet, klapproos, knopkruid, ooievaarsbek, muur, viooltje, varkensgras, perzikkruid, kruiskruid, kleefkruid, dovenetel.

TITUS is erkend in korrel- en kuilmaïs vanaf stadium 4 tot 8 blad (BBCH 14-18).

TITUS wordt toegepast aan een dosis van 30-40 g/ha per behandeling, een tweede toepassing is erkend aan maximum 30 g/ha maximum voor het 8-blad stadium.

Om een goede selectiviteit bewaren, wordt **TITUS** steeds in combinatie gebruikt met een herbicide die een safener bevat type isoxadifen aanwezig in **LORTAMA** of andere klassieke herbiciden.

Risicobeperkende maatregelen, bufferzone van 1 m tov oppervlaktewater.



Straatgras



Hanepoot



Herik



Herderstasje



P : Produit pour les professionnels. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez <https://fytoweb.be/fr/autorisations>

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2026 CORTEVA