

EE

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3: Mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimkaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

**HÄDAABI TELEFON 112.
Mürgistusteabeskuse lühinumber 16662.**

LV

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesāpnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.

Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem.

SPe3 Lai aizsargātu izdigušus un neizdigušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītu izdigušus un neizdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.

LT

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenazą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra kloprialido dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 m iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba 8 687 53378

Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!



Lontrel™ 600 SL

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Selektivne tārķamstājārselt kevadēl kasutātāvē herbītsīd, mīs on mēldūd laialeheliste umbrohtude tōrķeks suvi- ja taliteraviljadel, suvi- ja talirapsit, maisil, suhkrupēdill, sōddapeedil, peedil, karjamaadel ja puukoolides. Lontrel 600 SL hāvītāb paljusid umbrohlīkie, nt. kesalil, konnatatar, rukkilil ja pōldohakas.

Toodet vōib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained: 600 g/l klopīrālīdī
Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentrāat (SL)
Eesti reg. nr.: 749/04.02.19
Valmistamise aeg: vaata pakenditl
Partii nr.: vaata pakenditl
Sāilivusaeg: 2 aastat
Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Registreerimise haldaja:
Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhāgeni K,
Taani. Tel: +45 45 28 08 00

LV

Selektīvs sistēmas iedarbības herbīcīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu, lopbarības biešu, galdā biešu, ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu un ziemas miežu ar/bez stiebrzaļu pašējas, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu ar/bez stiebrzaļu pašējas, kukurūzas, līnu, ziemas rapša, ziemas rīpša, vasaras rapša un vasaras rīpša sējumos, galvīnkāpostu, Savoņas kāpostu un zemeņu stādījumos, ganībās, stiebrzaļu sējumos sāklai un egļu un balteglu sējumos un stādījumos kokaudzētāvās.

Darbīgās vielas: klopīrālīds 600 g/l
Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: 0666
Reģistrācijas klase: 2
Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.
Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:
Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhāgeni K, Dānija
Dow AgroSciences Danmark A/S atstovas Lietuvos: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel. +371 2897 5155

LT

Lontrel 600 SL skīrtas dvīskilīju pīktzōļi naikinīmi ziemiņuose ir vasarīņuose kvīēžuose, ziemiņuose ir vasarīņuose mīēžuose, ziemiņuose ir vasarīņuose kvīetruģuose, ziemiņuose ir vasarīņuose ruģuose, avīžose, cukrīņuose ir pašarīņuose runkeliuose, burokēliuose, gūžīņuose kopūstuose, līnuose, sēklīņuose varpīņi zōļi pasēliuose, ziemiņuose ir vasarīņuose rapsuose, brāškēse, rapsukuose, spyģluociū sodīnkams medēlynuose.

Preparatās skīrtas profesionalīajam naudojīmūi.

Veiklīosios medīziagos:
klopīrālīdas 600 g/l (48,5 %)
Preparato forma: tīrpus koncentrāts
Reģistrācijas Nr.: AS2-53H(2018)
Siuntos Nr.: žiūrēti ant pakutēs.
Pagamīnīmo data: žiūrēti ant pakutēs.
Galīojīmo laīkas: 2 metai nuo pagamīnīmo datos

Preparatą registravo: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija
Dow AgroSciences Danmark A/S atstovas Lietuvoje: Dow AgroSciences Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town, Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva. Tel. +370 5 2100260



0111009481902



NETOKOGUS / NETO / GRYNASIS KIEKIS: 1 L

Lietošanas instrukcija latviski seko pēc teksta igauņu valodā.
Naudojimo instrukcija lietuvīškai pateikiama po estišku ir latvišku tekstu.



TOOTE OHUTUSINFORMATSIOON

Ettevaatusabinõud

Enne kasutamist tutvuda alati toote etiketiga, täita tööohutuse eeskirju. Käidelda ja ladustada hästi ventileeritud ruumis. Kasutada sobivaid isikukaitselahendeid. Pesta käed ja nāgu kohe pärast töö lõpetamist. Vältida taimekaitsetahendi sattumist nahale ja silma ning pritsimisdudu sissehingamist.

Esmaabi

Sissehingamisel: Vārske õhk, puhkus. Vajadusel teha kunstlikku hingamist. Põõrduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputada koheselt silmi (avatud limalaugudega) rohke veega 15 minutit, põõrduda arsti poole.

Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist, põõrduda viivitamatult arsti poole ja nāidata pakendit või etiketti.

Nahaga kokkupuutel: Võtta seljast määrdunud riided. Pesta koheselt nahka rohke vee ja seebiga. Vajadusel põõrduda arsti poole. Halva enesetunde korral põõrduda koheselt arsti poole ja nāidata käesolevat etiketti.

Soovitused arstile: Spetsiifiline vastumürk puudub. Jālgida kannatanut, ravi on sūmptomaatiline.

HĀDAABI TELEFON 112. Mūrgistustebekeskuse lūhinumber 16662.

Keskonnaohhtlikkus

Vāltida preparaadi jākāide, tōõlahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Taara purunemisel

Mahālāinud preparaata koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda ūle ohtlike jātmete kāitlejale. Juhul, kui preparaati pole vōimalik teistmoodi ohtustada, tuleb mullale sattunud aine eemaldada koos pinnasekihiga, koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda ūle ohtlike jātmete kāitlejale.

TĀHTIS

Kogu informatsioon on kinnitatud ning kooskōlastatud toote etiketil. Selleks, et tagada toote ohutu ja tulemuslik kasutamine, tuleb antud juhendit lugeda vāga tēhelepanelikult.

Kasutamisoõpetus

Toimeviis

Lontrol 600 SL on selektiivne tārkamisjārgselt kasutatav herbitsiid, mis on mōeldud laialeheliste umbrohtude tōrjeks paljudel kultuuridel. Lontrol 600 SL hāvitat paljusid umbrohuliike, nt. kesallil, konnatatar, rukkilill ja pōldohakas. Lontrol 600 SL on sūsteemne herbitsiid, mis imendub taimedesse peamiselt lehtede kaudu. Klopõrālilid liigub taimes sūsteemsel, pidurdades taimede kasvu ja ainevahetust ning selle tulemusel tundlikud umbrohud surevad. Tundlikel taimedel on mōju mārghata juba 1-3 pāeva pārast pritsimist. Kasv peatub ning umbrohi hāvineb 3-4 nādalaga.

Ilmastikutingimused pritsimise ajal

Lontrol 72 SG pritsitakse aktiivse kasvu perioodil, st. niisketel tingimustel. Optimaalseim pritsimistemperatuur jāāb vahemikku 10-12°C. Mitte pritsida, kui on tegemist vāga kuuma vōi vāga jaheda ilmagā. Mitte pritsida vahetult pārast õkōkõlma ega õkōkõlmade ajal.

Doseerimine ja pritsimise ajastamine

TĀHELEPANU

Lontrol 600 SL-i ei tohi pritsida, kui teravilja allakõlvīs on kasutatud kaunvilju ja/vōi ristikut. Karjamaadel on ooteaeg 7 pāeva (aeg, mis tuleb oodata enne kui loomad karjamaale lasta).

Kultuurid	Kulunorm l/ha	Kultuuri kasvustaadium, BBCH
Suviteravili (oder, kaer ja nisu)	0,2	21-37 (võrsumisest lipulehe ilmumiseni)
Taliteravili (nisu, oder, rukis ja tritikale)	0,2	21-37 (võrsumisest lipulehe ilmumiseni)
Mais	0,2	13-16 (alates 3. lehest kuni 6. pärisleheni)
Peet (sõõgi-, suhkru- ja sõõda-)	0,2	12-15 (2. pärislehest kuni 5. pärisleheni)
Puukoolid	0,2	Kevadine pritsimine
Karjamaad	0,2	21-37 (võrsumisest lipulehe ilmumiseni)
Suviraps	0,2	12-55 (alates 2.lehest kuni esimeste õiepungadeni)
Taliraps	0,2	31-55 (varsumisest kuni esimeste õiepungadeni)

1 kasutuskord kasvuhooja jooksul.

Umbrohu spekter

Tõhusus >90%	<i>Anthemis arvensis</i> (valge karikakar), <i>Cirsium vulgare</i> (tuliohakas), <i>Senecio vulgare</i> (harilik ristirohi), <i>Bidens tripartita</i> (kolmisruse), <i>Artemesia vulgaris</i> (harilik puju), <i>Chrysanthemum segetum</i> (kollane jaanikakar), <i>Lapsana communis</i> (harilik linnukapsas), <i>Erigeron annuus</i> (ūheaastane õnnehein), <i>Trifolium ssp</i> (ristik), <i>Centaurea cyanus</i> (rukkilill), <i>Matricaria chamomilla</i> (lõhnav kummel), <i>Matricaria perforata</i> (harilik kesallil), <i>Chamomilla recutita</i> (teekummel), <i>Taraxacum officinale</i> (võilill) ja <i>Sonchus ssp</i> (piimohakas).
Tõhusus 70-90%	<i>Achilla millefolium</i> (harilik raudrohi), <i>Fagopyrum esculentum</i> (harilik tatar), <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Carduus crispus</i> (paljas vōõrkakar), <i>Anthriscus cerefolium</i> (aed-harakaputk), <i>Achillea millefolium</i> (harilik raudrohi), <i>Polygonum convolvulus</i> (pōdkonnatatar), <i>Helianthus annuus</i> (harilik pāevalill), <i>Solanum nigrum</i> (must maavits), <i>Vicia</i> (hiirehernes) ja <i>Daucus carota</i> (metsporgand).

Jārgnevad kultuurid

Lontrol 600 SL suhtes on tundlikud jārgnevad kultuurid:

- kartul ja teised maavitsalised
- hernes, uba, lupiin ja teised liblikõielised/kaunviljad
- porgand ja teised sarikõielised
- lehtsalat ja teised korvõielised

Jārelkultuuride osas piirangud puuduvad, kui jārghida head põllumajandustava: kui kultuuri on tootega tōõdeldud vastavalt selle kasutusjuhisele, ei ole laiali laotatud ning pinnasesse kōntud taimematerjal ohtlik kevadel kōlvatavale tundlikule kultuurile.

Lontrol 600 SL-iga tōõdeldud kultuuri taimematerjal, mis ei ole korralikult lagunenu, vōib kahjustada tundlikku jārelkultuuri. Seetōttu ei ole soovitat kōlvata tundlikku kultuuri vahetult pārast Lontrol 600 SL-iga tōõdeldud kultuurist pārineva taimematerjali pinnasesse kōndmist. Mitte kasutada Lontrol 600 SL-iga tōõdeldud kultuurist pārinevat pōhku kasvuhoones.

Ūmberkõlv

Juhul, kui kevadel on vajadus ūmberkõlviks pārast Lontrol 600 SL-iga tōõtlemit, tuleb taimējāānused hoolikalt pinnasesse kōnda vōi kultiveerida ning lasta seista 6 nādalat enne uut suviteravilja, maisi vōi heintaimede kōlvarnist.

Resistentsus

Toimeaine klopõrālilid kuulub herbitsiidide gruppi O. Tootja soovib kasutada tōhusat resistentsuse tekkimise vastast strateegiat, rakendades WRAG (Weed Resistance Action Group) juhiseid. Vāltimaks resistentsuse tekkimist, soovib tootja kasutada juuresolevatel kultuuridel erineva toimeainega tooteid ning segusid. Soovitatav on kasvatada vaheldumisi suvi- ja talivilja. Tāhelepanu tuleb pōõrata toote vōimalikule vahenevale toimele, sest see vōib viidata resistentsuse tekkimisele. Seepārast on soovitat kasutada pritseprogrammides erinevaid toimeaineid.

Muld

Lontrel 600 SL-i võib kasutada kõikidel mullastikutüüpidel.

Vihmakindlus

Lontrel 600 SL on normaalingimustes vihmakindel 6 tunni möödumisel pritsimisest.

Pritsimisvõtted ja vee hulk

Lontrel 600 SL-i tuleb pritsida traktori külge kinnitatud või iseliikuva taimekaitsepritsiga ning tingimustel, et need on heas töökorras ning on kalibreeritud vastavalt tootja soovitusetele. Soovitatav pritsimiskogus on 100-300 liitrit vett hektari kohta.

Pritsimislahuse valmistamine

Enne preparaate kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejääke. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel.

Täita pool paaki veega, lisada paaki ettenähtud hulk Lontrel 600 SL-i. Seejärel pidevalt segades täita paak veega. Jätkata segamist kuni pritselahus on valmis. Pritsimiseks kasutada ainult puhat vett.

Kui kasutatakse pritsi, millele on paigaldatud täiteanum, kasutada alljärgnevat meetodit (meetod on kasutatav, kui anum on sellist tüüpi, mida on võimalik veega täita): täita pool anumat veega. Lisada paagitäie lahuse valmistamiseks vajalik kogus toodet. Avada ventiil ning imeda kogu pritselahus paaki. Samal ajal lisada anumasse juurde puhat vett. Korrata toimingut kuni anumasse ei ole jäänud preparaadi jälgi.

Kokkusobivus teiste preparaatidega

Lontrel 600 SL-i võib kasutada segudes koos fungitsiididega, insektsiididega, kasvuregulaatorite ja mikrovetistega.

Pritsi puhastamine

Vältimaks järgneva kultuuri kahjustumist, tuleb kõik pritseseadmed hoolikalt puhastada nii seest kui väljast koheselt pärast kasutamist. Selleks kasutada vastavat pesuvahendit All Clear Extra vastavalt alljärgnevale juhendile:

1. Tühjenda prits koheselt pärast kasutamist. Pritsi välispinnale jäänud lahus tuleb eemaldada puhta veega pestes.
2. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega, kasutades vähemalt kümnendikku paaki mahtuvusest. Nõruta paak täielikult tühjaks.
3. Täida paak poolenisti puhta veega ning lisa soovitatav kogus pesuvahendit All Clear Extra. Sega ning pihusta lahus läbi voolikute ja jaotustorude, seejärel täida pritsi paak täielikult veega ning lase seista 15 minutit. Pesuvedelik pihustada läbi voolikute ja jaotustorude juba töödeldud kultuurile. Pihusta lahus läbi voolikute ja jaotustorude ning nõruta paak kuivaks.
4. Võta ära pihustid ja filtrid ning pese need All Clear Extra pesuainega vahekorras 50 ml pesuainet 10 liitri vee kohta.
5. Loputa paak puhta veega. Vesi lase läbi pritsi jaotustorude ja voolikute, kasutades vähemalt kümnendikku paagi kogumahust. Paak nõruta kuivaks.
6. Kahjutustamise kohta loe pestiisidide ning paagipesu kasutus- ja ohutusjuhendit. Mitte pritsida kõrvalasuvaid kultuure.

Tähelepanu: Kui ei ole võimalik paaki täielikult tühjendada, tuleb punkti 3 korrata enne, kui minnakse toimuigu 4 juurde.

Pritsi väline puhastamine

Pritsi ja traktori puhastamine peab toimuma samal põllul, mida töödeldi või selleks ettenähtud alal, kus on pesuvee kogumise võimalus paakidesse või muudesse anumatesse. Kui te puhastate pritsi äsja töödeldud põllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett.

Hoiutingimused

Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas mitte alla 0°C ja üle +30°C. Hoida otse päikesekiirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toidust, joogist ja loomasaõdast. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“.

Taara kahjutustamine

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töolahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitsevahendi paaki või kasutada selleks vastavat tankimiseseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālrūna numurs: 67042473

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietotie individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgas cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS

Lontrol 600 SL ir sistēmas iedarbības herbicīds, kas galvenokārt tiek uzņemts caur lapām un pēc tam izplatās pa visu augu. Preparāta iedarbība uz aktīvi augošajām jutīgajām nezālēm ir novērojama jau 1.-3. dienā pēc smidzināšanas. Nezāļu augšana apstājas un tās iet bojā 3-4 nedēļu laikā.

Lontrol 600 SL satur darbīgo vielu klopīralīds 600 g/l. Klopīralīds sistēmiski izplatās pa visu augu un izjauc normālus augu augšanas procesus, izraisot jutīgu augu sugu bojāeju.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Lontrol 600 SL var lietot visās ziemas un vasaras rapša, ziemas un vasaras rīpša, ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, ziemas tritikāles un rudzu šķirnēs ar vai bez stiebrzālī pašējās, kukurūzā, cukurbietēs, lopbarības un sarkanajās bietēs, galvīnkāpostos, Savojas kāpostos, līnos, egļu un balteglu sējumos un stādījumos kokaudzētāvās, zemenēs, stiebrzāļu sēklu laukos un ganībās. Var veikt tikai rindu apstrādi vai arī lokālu apstrādi, cadijums, kad tas ir nepieciešams.

KLIMATISKIE APSTĀKLI

Apstrāde ar Lontrel 600 SL jāveic nezaļu aktīvas augšanas laikā. Optimālā lietošanas temperatūra ir virs +10 - 12 °C. Nesmidzināt ilgstoša sausuma periodā, kā arī ļoti karstā vai aukstā laikā. Apstrādi neveikt uzreiz pēc salnām.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājami kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumus kultūrauga divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15)	-	1
Galviņkāposti, Savoļas kāposti*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt stādījumus pēc kultūrauga iesakņošanās, tā divu līdz piecu lapu stadijā (AS 12-15)	-	1
Ziema kvieši, ziema tritikāle, rudzi, ziema mieži ar/bez stiebrzāļu pasējas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumus pavasarī atļaujoties veģetācijai sākot ar kultūrauga cerošanās sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgie organismi	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/ bez stiebrzāļu pasejas	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanās sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Kukurūza	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumu, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz piecu lapu stadijai (AS 12-15)	-	1
Lini	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga otro lapu pāri līdz linu ziedkopas attīstības stadijas vidum (AS 12-55)	-	1
Stiebrzāles (sēklu lauki)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanās sākumu līdz karoglapas parādīšanās stadijai (AS 21-37)	-	1
Vasaras rapsis, vasaras ripsis*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga divu lapu stadiju līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 12-55)	-	1
Ziemas rapsis, ziemas ripsis*	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot ar kultūrauga pirmo starpmegzļu posmu līdz redzamas galvenās ziedkopas (AS 31-55)	-	1
Ganības	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt ganības pavasarī, sākot ar stiebrzāļu cerošanās sākumu līdz to attīstības karoglapas stadijai (AS 21-37)	7	1
Zemenes	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt stādījumus pēc ražas novākšanas.	-	1
Egles, baltegles (kokaudzētāvās)	Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles	0.2	Apsmidzināt stādījumus, kad stādi iesakņojušies	-	1

*Mazais lietojums. Darbības iomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Piezīme.

Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītu izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei.

Nepieciešamais bezlietus periods pēc Lontrel 600 SL lietošanas ir 6 stundas.

Lontrel 600 SL var lietot visu tipu augsnēs.

Lontrol 600 SL iedarbības efektivitāte ar devu 0.2 l/ha

Efektivitāte >85%	Lauka ilzīte (<i>Anthemis arvensis</i>), zila rudzupuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), ārstniecības kumelīte (<i>Matricaria chamomilla</i>), tīruma kumelīte (<i>Matricaria inodorum</i>) parastā vibotne (<i>Artemisia vulgaris</i>), tīruma usne (<i>Cirsium arvensis</i>), sīkziedu sīkgalvīte (<i>Galinisoga parviflora</i>)
Efektivitāte 70-84,9%	Dārza mikstpienes (<i>Sonchus sp.</i>) dārza vējgrīķis (<i>Polygonum convolvulus</i>), parastais pelašķis (<i>Achillea millefolium</i>)

PĒCKULTŪRAS

Lūdzam ievērot, ka šādi kultūraugi ir jutīgi pret Lontrol 600 SL:

- Kartupeļi un citi nakteņu dzimtas augi;
- Zirņi, pupas, lupīna un citi tauriņziežu dzimtas augi;
- Burkāni un citi čemurziežu dzimtas augi;
- Salāti un citi asteru dzimtas augi.

Ierobežojumi nākošajā gadā audzējamiem kultūraugiem nepastāv, ja augu, apstrādātu ar Lontrol 600 SL , pēcplaujas atliekas rudenī tiek iestrādātas augsnē.

Nesadalījūšas ar Lontrol 600 SL apstrādātu augu pēcplaujas atliekas var kaitēt jutīgajām kultūraugu sugām, tāpēc nerekomendējam sēt vai stādīt pret Lontrol 600 SL jutīgus kultūraugus uzreiz pēc augu atlieku iestrādes augsnē.

Nelietot ar Lontrol 600 SL apstrādātu augu atliekas (salmus) kā augsna substrātu siltumnīcās.

Gadjūmā, ja ar Lontrol 600 SL apstrādāts kultūraugs ir gājis bojā (salnas, slimības, kaitēkļi), obligāti ir jāveic augsnes aršana un jānogaida 6 nedēļas. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu vai stiebrzāles.

Lontrol 600 SL var ietekmēt divdīgļlapju augus tieši caur lapām vai arī netieši caur saknēm no apsmidzinātas augsnes. Nepieļaut smidzinājuma nonākšanu uz blakus augošiem divdīgļlapju kultūraugiem, kurus nav paredzēts apstrādāt ar šo produktu.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS

Izsmidzinot Lontrol 600 SL darba šķidruma patēriņam jābūt no 100 līdz 300 litriem uz 1 hektāru. Smidzināšanai lietojiet sprauslas, kas nodrošina smalku līdz vidēju pilieni lielumu.

DARBA ŠĶIDUMA SAGATAVOŠANA

Piepildiet smidzinātāja tvertni līdz pusei ar ūdeni, ieslēdziet maisītāju, pievienojiet vajadzīgo Lontrol 600 SL daudzumu un, nepārtraucot maisīšanu, piepildiet tvertni ar atlikušo ūdens daudzumu. Nepārtrauciet maisīšanu līdz smidzināšanas beigām. Lietojiet tīru ūdeni!

Ja smidzinātājam ir atsevišķa darba šķidruma sagatavošanas tvertne, darba secībā jābūt nedaudz atšķirīgai (ši metode ir pielietojama tikai smidzinātājiem, kuriem šī tvertne var tikt piepildīta ar ūdeni):

Piepildiet darba šķidruma sagatavošanas tvertni līdz pusei ar ūdeni, pievienojiet tajā nepieciešamo Lontrol 600 SL daudzumu. Atveriet vārstu un pārsūknējiet sagatavoto maisījumu izsmidzināšanas tvertnē, tai pašā laikā pievienojot tīru ūdeni darba šķidruma sagatavošanas tvertnē. Atkārtējot to līdz tvertnei ir iztīrīta no produkta atliekām. Pārlicinieties, ka darba šķidruma sagatavošanas tvertne ir tīra pirms pievienojiet citu produktu tvertnes maisījumam.

SAVIETOJAMĪBA

Lontrol 600 SL var izmantot tvertnes maisījumos ar izplatītajiem herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem un mikroelementiem. Neskaidrību gadījumā kontaktējieties ar firmas pārstāvi Latvijā.

PRETREZISTENCES STRATĒGIJA

Dow AgroSciences rekomendē ievērot pretrezistences stratēģiju, kura ir izstrādāta WRAG (Weed Resistance Action Group, atvasinājumiem (O grupas preparāts, pēc HRAC)).

Lai novērstu vai aizkavētu rezistences izveidošanos, rekomendējam lietot herbicīdus ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem augsekas rotācijas laikā vai arī veidot to tvertnes maisījumus. Tāpat ieteicams ir mainīt vasarāju un ziemāju kultūraugus augsekas rotācijas laikā. Pievērsiet uzmanību gadījumiem, ja produkta lietošanas efektivitāte samazinās, kas var norādīt uz rezistences veidošanās sākumu. Atkārtota herbicīdu lietošana ar vienu un to pašu iedarbības mehānismu vienā un tai pašā laukā pret vienām un tām pašām nezālēm var radīt rezistēntas nezāļu populācijas izveidošanos.

SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

Lai novērstu nākošo apstrādājamo kultūraugu, izņemot graudaugus, iespējamās bojājumus, smidzināšanas iekārta pēc lietošanas ir rūpīgi jānomazgā gan no iekšpuses, gan ārpusē, lietojot speciālo mazgāšanas līdzekli All Clear Extra.

1. Iztukšojiet smidzinātāju uz lauka pilnībā. Uzreiz pēc smidzināšanas beigām nomazgājiet to no ārpusē.
2. Izskalojiet smidzinātāja tvertni ar tīru ūdeni un iztukšojiet to, izsmidzinot skalošanas ūdeni caur sprauslām. Skalošanas ūdeni ieteicams izsmidzināt uz tikko apsmidzinātā lauka. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
3. Piepildiet smidzinātāja tvertni ar ūdeni līdz pusei un pievienojiet rekomendēto daudzumu All Clear Extra. Samaisiet un izsmidziniet nelielu daudzumu šķidruma caur sprauslām. Piepildiet tvertni pilnu ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju uz 15 minūtēm. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
4. Sprauslas un filtri jānomazgā ar ūdeni, kuram pievienots All Clear Extra 50 ml uz 10 litriem ūdens.
5. Skalojiet tvertni ar tīru ūdeni. Iztukšojiet smidzinātāju caur sprauslām piemērotā vietā. Iztukšojiet smidzinātāju pilnībā.
6. Mazgāšanas un skalošanas ūdeņi jānovirza vietās, kur tie nevar nodarīt kaitējumu apkārtējai videi un nevar nonākt gruntsūdeņos vai virszemes ūdens tilpnēs. Neizsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai tīrumos, kur tos paredzēts audzēt.

Piezīme: Ja tvertni nav iespējams iztukšot pilnībā, 3. punktā minētās darbība ir jāatkārto, pirms veic 4. punktā minētos pasākumus.

VIDES AIZSARDZĪBA

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārmot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlišanas gadījumā piesārmoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

TUKŠĀ TARA

Pēc iztukšošanas iepakojumu nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes un skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmatot darba šķidruma pagatavošanai. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacījumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacījumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.

• – Dow AgroSciences LLC



NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

VEIKIMO BŪDAS

LONTREL 600 SL yra sisteminio tipo herbicidas, įsavinamas per lapus. Pirmieji herbicido veikimo požymiai jautrioms piktžolėms pastebimi po 1-3 dienų po purškimo. Tuomet piktžolių augimas sustoja. Galutinai piktžolės žūsta po 3-4 savičių.
LONTREL 600 SL sudėtyje yra 600 g/l klopuralido, kuris augale juda sistemiskai ir išreguliuoja jautrių augalų metabolinius bei augimo procesus, to pasekoje jie žūva.

KLIMATINĖS SĄLYGOS

LONTREL 600 SL turi būti purškiamas piktžolėms aktyviai augant, esant palankioms drėgmės sąlygoms.
Optimali temperatūra purškimo metu – 10-12°C.
Nepurkšti esant sausrui, labai karštam ar šaltam orui, šalų metu ar iš karto po jų.

AUGALAI

LONTREL 600 SL gali būti naudojamas visų veislių žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose rugiuose, avižose, rapsukuose, linuose, gūžiniuose kopūstuose, cukriniuose runkeluose ir pašariniuose runkeluose, burokėliuose, gūžiniuose kopūstuose, linuose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, braškėse, rapsukuose, spygliučių sodinukams medelynuose.
Purškimas juostiniu ar atrankiniu būdu rekomenduojamas tuose pasėliuose, kur tai galima pritaikyti.

NORMOS

Augalas	Norma l/ha	Naudojimo laikas BBCH
Vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai, avižos	0.2	BBCH 21-37
Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	0.2	BBCH 21-37 (pavasarinis naudojimas)
Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai	0.2	BBCH 12-15
Vasariniai rapsai	0.2	BBCH 12-55
Žieminiai rapsai	0.2	BBCH 31-55 (pavasarinis naudojimas)
Linai	0.2	BBCH 31-55
Gūžiniai kopūstai	0.2	BBCH 12-15
Varpinės žolės sėklai	0.2	BBCH 21-37 (pavasarinis naudojimas)
Spygliučių sodinukai medelynuose	0.2	Naudojama pavasarį, sumedėjusiuose augaluose
Braškės	0.2	Nuėmus derlių
Rapsukai	0.2	BBCH 12 - 55

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS:

Naudojimas linams, varpinėms žolėms sėklai, rapsukams, gūžiniams kopūstams, braškėms, išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglmento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

NORMOS IR ŽOLIŲ SPEKTRAS

EFEKTYVUMAS, kai norma 0.2 l/ha

Efektyvumas 95 - 100%	Dirvinis bobramunis (<i>Anthemis arvensis</i>), rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>), vaistinė ramunė (<i>Matricaria chamomilla</i>), bekvapė ramunė (<i>Matricaria inodorum</i>),
Efektyvumas 85 – 94,9 %	paprastasis kietis (<i>Artemisia vulgaris</i>), dirvinė usnis (<i>Cirsium arvensis</i>), paprastoji kraujažolė (<i>Achillea millefolium</i>), smulkiažiedė galinsoga (<i>Galinsoga parviflora</i>), vijoklinis pelėvirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>), juodoji kiauliauogė (<i>Solanum nigrum</i>),
Efektyvumas 75 – 84,9 %	Pienės (<i>Sonchus sp.</i>)

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Nurodymai naudojimui

LONTREL 600 SL turi būti išpurškstas traktoriniais hidrauliniais tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais purkštuvais.

DIRVA

LONTREL 600 SL gali būti naudojamas visų tipų dirvožemiuose.

KITAIŠ METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI

Herbicidui LONTREL 600 SL jautrūs augalai:

- bulvės ir kiti *Solanum* šeimai priklausantys augalai
- žirniai, pupos, lubinai ir kiti ankštiniai augalai
- morkos ir kiti skėtiniai augalai
- salotos ir kiti graižaziedžiai augalai.

Jokių apribojimų kitais metais auginamiems augalams nėra, jeigu augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 600 SL, liekanos rudenį paskleidžiamos dirvos paviršiuje ir apariamos.

Augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 600 SL, nesupuvusios liekanos gali pakenkti kitais metais auginamiems jautriems augalams. Todėl nesėkite jautrių augalų iškart užarus augalų, apdorotų herbicidu LONTREL 600 SL, liekanas.
Nenaudokite šiaudų, kurie buvo apdoroti herbicidu LONTREL 600 SL, šiltnamiuose kaip augalų grunto.

ATSĖJIMAS

Jei pasėlis, nupurškstas LONTREL 600 SL pavasarį dėl kokių nors priežasčių žuvo, augalų liekanas reikia aparti ar giliai įkultivuoti į dirvą ir palikti 6 savaites prieš pradendant vasarinių javų, kukurūzų ar žolių sėją.

VANDENS NORMA

LONTREL 600 SL rekomenduojama naudoti 100-300 l/ha tirpalo.

PURŠKIMO KOKYBĖ

Purškdami LONTREL 600 SL naudokite smulkiažiusių ar vidutinio smulkumo purkštukus.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pusę purkštuvo užpildykite vandeniu ir per purkštuvo viršų įpilkite reikiamą LONTREL 600 SL kiekį. Įjunkite maišytuvą ir užpildykite purkštuvo talpą likusiu vandens kiekiu. Maišytuvo neišjunkite kol baigsite purkšti. Naudokite tiktai švarų vandenį.

Jei dėl kokių nors priežasčių LONTREL 600 SL negali būti įpiltas į purkštovo talpą per viršų, o purkštuvą turi išmaišymo indą gali būti naudojamas toks metodas (šis metodas gali būti naudojamas esant galimybei išmaišymo indą užpildyti vandeniu):
Išmaišymo indą užpildykite vandeniu iki pusės.
Įpilkite reikiamą LONTREL 600 SL kiekį.

Atidarykite vožtuvą, kad tirpalas subęgtų į purkštuvo talpą ir tuo pat metu įpilkite dar švaraus vandens į išmaišymo indą.

Kartokite procedūrą, kol produkto likučių neliks išmaišymo inde.

Prieš pildami kitą produktą į maišymo indą, įsitikinkite, kad jis visiškai švarus.

LAIKAS IKI LIETAUS

Lietus 6 val. po nupurškimo įtakos LONTREL 600 SL veikimui neturi

MAIŠYMAS

LONTREL 600 SL mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

POVEIKIS ŠALIA AUGANTIEMS AUGALAMS

LONTREL 600 SL gali veikti dviskilčius augalus tiesiogiai patekdamas per lapus ar netiesiogiai - per šaknis. Vengti produkto dulksnos patekimo ant šalia augančių dviskilčių augalų.

DĖMESIO

LONTREL 600 SL negalima purkšti ankštinių augalų ir javų su dobilų įsėliu.

ATSPARUMO STRATEGIJA

Veiklioji medžiaga – klopiralidas. Pagal veikimo pobūdį, remiantis HRAC (Herbicide Resistance Action Committee) klasifikacija, jis yra sintetinis auksinas, HRAC kodas Q. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautrių ar natūraliai atsparių individų.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, reikia laikytis HRAC rekomendacijų:

1. taikyti integruotą piktžolių kontrolės sistemą.
2. paeiliui ar skirtingais metais tame pačiame lauke naudoti skirtingo veikimo pobūdžio herbicidus, naikinančius tas pačias piktžoles.
3. naudoti pilną herbicido rekomenduojamą normą ir nurodytu laikui.
4. panaudojus herbicidą, patikrinti lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleisti piktžolėms dauginis vegetatyviškai ir sėklomis.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiesiu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgus kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m²) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m²) bei avėti tvirtą avalynę. Dirbant purkštuvu priežiūros darbus, liečiant produkto talpų užterštus paviršius rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Siekiant apsaugoti pašalinius asmenis ir gyventojus operatoriai privalo laikytis ne mažesnės kaip 2 metrų apsaugos zonos iki kelių kelkraščių ribos, gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo teritorijų ribos.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukus nusivilti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitėpus pirštinių paviršiai, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nusivilti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskaitinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po purškimo purkštuvu talpą, vamzdynus ir purkštukus reikia gerai išplauti švari vandeniu ir specialia priemone, mes rekomenduojame naudoti All Clear Extra™.

SAUGOJIMAS

Produktą laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje toliau nuo aukštos temperatūros šaltinio.

Laikyti tik originalioje pakuotėje, temperatūra laikymo metu - 0°C - +30°C.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimų žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

PASTABA

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

EE

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P501: Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3: Mittesihmarmaitse kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast pihuvõõndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

**HÄDAABI TELEFON 112.
Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

LV

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.
P280 Izmantojiet aizsargcimdus/aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.
P501 Atbrīvoties no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
SP1 Nepiesāpnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā.
Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.
SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.
SPe3 Lai aizsargātu izdigušus un neizdigušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītu izdigušus un neizdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0°C līdz +35°C.

LT

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuotė (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenazą iš sodų ir nuotekų).
Siekiant apsaugoti požeminį vandenį, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klopuralido dažniau kaip kartą per trejus metus tame pačiame lauke.
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.
Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti apsaugos zoną 5 m iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba 8 687 53378

Avarijos atveju kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!



Lontrel™ 600 SL

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

®™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Selektiivne tārkamisjārgselt kevelad kasutatav herbitsiid, mis on mõeldud laialeheliste umbrohtude tõrjeks suvi- ja taliteraviljadel, suvi- ja talirapsil, maisil, suhkrupeedil, söödapeedil, peedil, karjamaadel ja puukoolides. Lontrel 600 SL hävitab paljusid umbrohuliike, nt. kesalill, konnatar, rukkilill ja põldohakas.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained: 600 g/l klopüraliid

Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat (SL)

Eesti reg. nr.: 749/04.02.19

Valmistamise aeg: vaata pakendit

Partii nr.: vaata pakendit

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

LV

Selektiivs sistēmas iedarbības herbicīds divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai cukurbiešu, lopbarības biešu, gada biešu, ziemas kviešu, ziemas tritikāles, rudzu un ziemas miežu ar/bez stiebrzāļu pasējas, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu ar/bez stiebrzāļu pasējas, kukurūzas, linu, ziemas rapša, ziemas rīpša, vasaras rapša un vasaras rīpša sējumos, galvīnkāpostu, sojas kāpostu un zemeņu stādījumos, ganībās, stiebrzāļu sējumos sākal un egļu un balteglu sējumos un stādījumos kokaudzētāvās.

Darbīgās vielas: klopīralīds 600 g/l

Preparatīvā forma: šķīstošs koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0666

Reģistrācijas klase: 2

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Sāilivusaeg: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

LT

Lontrel 600 SL skirtas dvīskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose ir vasariniuose kvietrugiuose, žieminiuose ir vasariniuose rugiuose, avižose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, burokėliuose, gužiniuose kopūstuose, linuose, sėkliniuose varpinių žolių pasėliuose, žieminiuose ir vasariniuose rapsuose, braškėse, rapsukuose, spygliuocių sodinukams medelynuose.

Preparatas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veiklosios medžiagos:

klopīralīds 600 g/l (48,5 %)

Preparato forma: tirpus koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: AS2-53H(2018)

Sijuntos Nr.: žiūrėti ant pakutės.

Pagamijimo data: žiūrėti ant pakutės.

Galliojimo laikas: 2 metai nuo pagamijimo datos

Registreerimise haldaja:

Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhagaeni K,
Taani. Tel: +45 45 28 08 00

Reģistrācijas ipašnieks un ražotājs:

Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411
Kopenhāgēna K, Dānija
Dow AgroSciences Danmark A/S
konsultants Latvija: Corteva Agriscience,
The Agriculture Division of DowDuPont.
Tel. +371 2897 5155

Preparatā registravo: Dow AgroSciences

Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411
Kopenhaga K, Dānija
Dow AgroSciences Danmark A/S
atstovas Lietuvoje: Dow AgroSciences
Lithuania UAB, Regus Vilnius Old Town,
Vilniaus str. 31, LT-01402, Lietuva.
Tel. +370 5 2100260

NETOKOGUS / NETO / GRYNASIS KIEKIS: 1 L