

EE

Hoiatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõvastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL. Pesta rohke veega ja seebiga.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL.

Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui

neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P337+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida

mahuti tihedalt suletuna.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Välidla saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3 Veeorganismide kaitsmiskeskuste pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m pinnaveekogudest.

Mittesihhtmärkimisväärt kaitsmiskeskuste pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Kasutuspiirang: Pixxaro EC ei tohi kasutada lähemal kui 5 m pinnaveekogudest ja lähemal kui 5 m

põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Esmaabi

Üldteave: Kasutada isikukaitsevahendeid. Spetsifilist vastumürki ei ole teada. Rakendades sümptomaatilist ravi. **Sissehingamisel:** Toimetada kannatanu viivitamatult värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel: Võtta seljast saastunud riided. Pesta nahka rohke vee ja seebiga 15-20 minutit. Tööriistu pesta enne taaskasutust. Helista mürgistusabi keskusesse või abi saamiseks arstile. Peske riided enne taaskasutamist.

Silma sattumisel: Hoidke silmad lahti ja loputage aeglaselt ja ettevaatlikult veega 15-20 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse pärast esimest 5 minutit ja seejärel jätkake loputamist silmad. Abi saamiseks pöörduda mürgistusteabekeskusesse või arsti poole.

Allaneelamisel: Loputada suud. Pöörduda arsti poole.

HÄDAABI TELEFON 112. MÜRGISTUSTEABEKESKUSE LÜHINUMBER 16662



LV

Uzmanību

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H410 Līd toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un

videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smīdinājumus.

P280 Izmantojiet aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu

aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu

ūdens daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi

izskaloj ar ūdeni vairākas minūtes. Izņem

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli

izdarīt. Turpināt skatot.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet

mediku palīdzību.

P501 Atbrīvoties no saturs/vertnes, ievērojot spēkā

esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesārot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli

un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku

ūdenslīdņu un ūdensteču tuvumā. Izsgāzies no

piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m

aizsargjoslu līdz ūdenslīdņiem un ūdenstečiem.

SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaietīsus

izdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus

laukam vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un

glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā oriģinālā

iepakojumā. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt

temperatūrā no 0 līdz 30 °C. Sargāt no bērniem.

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT

ATSARGIAI

Gali sukelti alerģinę odos reakciją.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiškas vandens organizmams,

sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti ruko/garu/aeroliozoli.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir

aplinkai kaimo rizikos, būtina vykdyti

naudojimo instrukcijas nurodymus.

Mūvėti apsauginis pirštines, dėvėti

apsauginius drabužius ir naudoti akių

(veido) apsaugos priemonės.

Jeigu sudirginama oda arba ja išsiera:

kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepaieina: kreiptis į

gydytoją.

Nusivilkinti užterštus drabužius ir išskalbi

prieš vėl juos apsivilkiant.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teises

akti reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos

produktu ar jo pakute (neplauti

purškimo įrenginių šalia paviršinio

vandens telkinio/vengti taršos per

dreną/į sodybą ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus,

būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki

paviršinio vandens telkinio ir melioracijos

griovinių.

Siekiant apsaugoti neteklinius augalus

būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki

ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į

Apsinuodijimų kontrolės ir

informacijos biurą telefonu:

8 52362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ

APSAUGOS PRODUKTĄ

PERSKAITYKITE NAUDOJIMO

INSTRUKCIJĄ

CORTEVA
agriscience

Pixxaro™ EC

Arylex™ active

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

®™™ Trademarks of Corteva, Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Pixxaro EC on süsteenne lehtedele kaudu mõjuv herbitsiid laialeheliste (kaheleheliste) umbrohtude tõrjeks talinuis, taliodras, rukkis, tritikales, suvinuis ja suvidoras.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

metüülhalauksifeen 12,5 g/l

(halauksifeenina 12 g/l); fluoksüüür

280 g/l (meptüülfluoksüüürina 403 g/l),

metüülklokvintoseet (taimekaitseaine)

12 g/l Sisaldab N,N-dimetüülrasvhape

amide.

Preparaadi vorm: emulsioonikonsentraat

Eesti reg. nr.: 0160/07.06.16

Valmistamise aeg: vaata pakendilt

Partii nr.: vaata pakendilt

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Registreerimise haldaja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhagaeni K,

Taani. Tel: +45 45 28 08 00



LV

Sistēmas iedarbības herbicīds izsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos.

Preparatīvā forma: emulsijas

koncentrāts

Darbīgās vielas:

metil-halauksifēns, 12,5 g/l,

fluoksipīrs, 280 g/l

Sastāvā esošā kaitīgā viela:

meksil-klokvintocets

Reģistrācijas Nr.: 0545

Reģistrācijas klase: 2

Derīguma termiņš: 2 gadi no

izgatavošanas datuma neatvērtā

oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas

datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas īpašnieks un ražotājs:

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhāgena K, Dānija

Corteva Agriscience Denmark A/S

konsultants Latvijā:

Corteva Agriscience,

Tel. +371 2897 5155,

www.corteva.lv

LT

Pixxaro EC yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių dvysklčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, miežių, rugių, kvietrugių, vasarinių kviečių bei miežių pasėliuose pavasarį.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Veiklosios medžiagos:

haloksifenmetilas 12,5 g/l (1,2 %)

fluoksipiras 280 g/l (fluoksipir-meptilas

403,5 g/l); 26,9 % (38,8 %)

Apsauginė medžiaga:

klokvintocet-meksilas 12 g/l (1,15 %)

Produkto forma: koncentruota

emulsija

Registracijos Nr.: AS2-60H(2020)

Sintus Nr.: žiūrėti ant pakuočės.

Pagamavimo data: žiūrėti ant

pakuočės.

Galiojimo laikas: 2 metai.

Preparatą registruoja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K,

Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S

atstovas Lietuvoje:

Corteva Agriscience Lithuania UAB,

Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110,

Lietuva. Tel. +370 5 2100260,

www.corteva.lt

0990439572012

NETOKOGUS/ NETO/ GRYNASIS KIEKIS: 5 L

Toimeviis

Pixoxaro EC on süsteemne herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks talinisu, taliodras, rukkis, tritikale, suvinisu ja suvioldras. Võib töödelda kõrrelistega segunenud põllukultuure. Ärge kasutage Pixoxaro liblikõieliste taimeaeda (nt ristikuga) segunenud põllukultuuridel.

Pixoxaro EC sobib ainult kevadel kasutamiseks.

Pixoxaro EC tõrjub paljusid üheaastaseid laialehelisi umbrohtusid, sh roomav madar ehk virm (*Galium aparine*), vesihein (*Stellaria media*), kukemagun (*Papaver rhoeas*), valge hanemalts (*Chenopodium album*), harilik punand (*Fumaria officinalis*), kurereha liigid (*Geranium spp*) ja kare kõrvik (*Galeopsis tetrahit*).

Pixoxaro EC sisaldab halauksifeeni ja fluoksüüpüüri, mis mõlemad kuuluvad sünteetiliste auksinide herbitsiidide hulka.

Nähtavalt tulemused ilmnevad tavaliselt mõni päev pärast pritsimist. Lõplikku tulemust saab oodata 4 nädalat peale pritsimist.

Ilmastikutingimused pritsimise ajal

Pixoxaro EC-d võib kasutada temperatuuridel 5 kuni 25 °C ja nii niiske kui ka kuiva ilma korral.

Ulatusliku püa korral võib herbitsiid toimne olla nõrgem.

Ärge pritsige stressis põllukultuure. Stressi võivad põhjustada mitmesugused tegurid, sh pakane, põud, üheleht, mikroelementide puudus, haigus, kahjurite rünnak jms. Herbitsiid Pixoxaro EC võib mõnikord põhjustada 2–3 nädalaga mõduvat kultuuri kolletumist, mis ei mõjuta teravilja saagikust ega kvaliteeti.

Kulunormid ja pritsimise aeg

Taliteraviljad (talinisu, talioder, rukis, tritikale)

Pixoxaro EC-d võib kasutada BBCH 23–29. faasis (3. võrest kuni võrsumise lõpuni) kulunormiga 0,25 l/ha, BBCH 30–39. faasis (kõrsumise algusest kuni lõpuni kulunormiga 0,4 l/ha ja BBCH 40–45. faasis (viljatupe avanemise kuni avanemise keskepaigani) kulunormiga 0,5 l/ha.

BBCH	Kulunorm	Efektiivsus ja umbrohuliigid		
		95-100% mõju	85-94,9% mõju	70-84,9% mõju
23-29	0,25 l/ha	Harilik punand (<i>Fumaria officinalis</i>) ja verev iminõges (<i>Lamium purpureum</i>)	Kurereha liigid (<i>Geranium spp</i>) ja roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>)	
30-39	0,4 l/ha	Ülaltoodud ja lisaks: roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>) ja kurereha liigid (<i>Geranium spp</i>)	Rukkilill (<i>Centaurea cyanus</i>), kukemagun (<i>Papaver rhoeas</i>), kare kõrvik (<i>Galeopsis tetrahit</i>) ja vesihein (<i>Stellaria media</i>)	
40-45	0,5 l/ha	Ülaltoodud ja lisaks: Puju (<i>Ambrosia</i>), kare kõrvik (<i>Galeopsis tetrahit</i>) ja vesihein (<i>Stellaria media</i>)	Rukkilill (<i>Centaurea cyanus</i>), kukemagun (<i>Papaver rhoeas</i>) ja harilik hiirekõrv (<i>Capsella bursa pastoris</i>)	Kartul (<i>Solanum tuberosum</i>)

Suviteraviljad (suvinisu ja suviolder)

Pixoxaro EC-d võib kasutada BBCH 13–19. faasis (3. pärislehe faasist kuni võrsumise alguseni) kulunormiga 0,125 l/ha, BBCH 20–29. faasis (võrsumise algusest kuni võrsumise lõpuni) kulunormiga 0,25 l/ha ja BBCH 30–45. faasis (kõrsumise algusest kuni viljatupe avanemise keskepaigani) kulunormiga 0,35 l/ha.

PIRMÄS PALUDZÄS

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļūvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūkļā ar ziepēm 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļūvis acīs, tās nekavējoties skalojot tekoša ūdens strūkļā 15 minūtes. Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļūvis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens. Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jēkbrū gadījumā vēlamā ārstu konsultācija. Uzrādīt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu lietotiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu, aizsargbrilles, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

PREPARĀTS UN TĀ IEDARBĪBAS VEIDS

Pixoxaro EC ir sistēmas iedarbības herbicīds ismūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos. Pixoxaro EC satur darbīgās vielas metil-halauksifēnu un fluoksipirālu, kuras pieder sintētisko auksinu herbicīdu grupai. Pixoxaro EC ierobežo šādas nezāles: kerauju madaru (*Galium aparine*), balto bālandu (*Chenopodium album*), parasto virzu (*Stellaria media*), sārtu pānātri (*Lamium purpureum*), ārstniecības matuzāli (*Fumaria officinalis*), gerānijas (*Geranium spp.*) un aklī (*Galeopsis tetrahit*). Parasti vizuālās pazīmes ir redzamas dažādu dienu laikā pēc apstrādes. Pilnīga herbicīda ietekme sagaidāma 4 nedēļu laikā pēc apstrādes.

LAIKA APSTĀKLĀ APSTRĀDEI

Pixoxaro EC var lietot gaisa temperatūrā no +5 līdz +25°C. Ilgstoša sausuma apstākļos var samazināties efektivitāte nezāļu ierobežošanā. Neapstrādājiet labību, kad tā atrodas stresa apstākļos. Stresa apstākļos var radīt daudzi faktori, tai skaitā sals, sausums, augsnes pārpuvošanās, minerālvietu trūkums, slimības, kaitēkļi u.tml. Reizēm pēc apstrādes Pixoxaro EC var izsaukt nelīdību, pārējais labības dzeltēšanu un aizkavēt augsšanu uz 2-3 nedēļām, kas neatstāj nelabvēlīgu ietekmi uz graudu ražu un kvalitāti.

LIETOŠANAS LAIKS UN DEVAS

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva l/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrādes skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Ismūža divdīgļlapju nezāles	0.25	Apsmidzināt sējumos pavasarī, atsākoties veģetācijai sākot ar trīs sēdzuņiem līdz cērošanās beigām (AS 23-29)	-	1
		0.4	Apsmidzināt sējumos pavasarī, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39)		
		0.5	Apsmidzināt sējumos pavasarī, sākot ar karoglapas maks pārslāšanās līdz karoglapas maks uzbrīšanai (AS 40-45)		
Vasaras kvieši, vasaras mieži	Ismūža divdīgļlapju nezāles	0.125	Apsmidzināt sējumos sākot ar trīs lapu stadiju līdz lapu attīstības fāzes beigām (AS 13-19)	-	1
		0.25	Apsmidzināt sējumos, sākot ar cērošanās sākumu līdz cērošanās beigām (AS 20-29)		
		0.35	Apsmidzināt sējumos, sākot ar cērošanās sākumu līdz karoglapas maks uzbrīšanai (AS 30-45)		

NAUDOSIMO REKOMENDACIJOS

Pixoxaro EC yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vieniemečių dviskilių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, miežių, rugių, kvietrugių ir vasarinių kviečių bei miežių pasėliuose pavasarį. Pixoxaro EC yra veiksmingas prieš daugelį vieniemečių piktžolių piktžolių, tokių kaip kibisų lipikas (*Galium aparine*), aguona birulė (*Papaver rhoeas*), baltoji balanda (*Chenopodium album*), raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*), vaistinė žvirbljarūtė (*Fumaria officinalis*). Galbūt naudojamas javų pasėliuose su miglinių žolių įsėliu. Nenaudokite javų pasėliuose su pupinių žolių įsėliu, tokių kaip dobilai ir kt.

VEIKIMO BŪDAS

Pixoxaro EC sudėtyje yra haloksifenmetlio ir fluoksipiro, kurie priklauso sintetinių auksinių herbicidų šeimai. Vizualiai poveikis matomas praėjus kelioms dienoms po purškimo. Galutinio poveikio galima tikėtis praėjus 4 savaitėms nuo purškimo.

NORMOS IR PURŠKIMO REKOMENDACIJOS

Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai: Pixoxaro EC gali būti purškiamas BBCH 23-29 (nuo 3 šoninio ūgio iki krūmijimosi pabaigos) 0,25 l/ha norma, arba BBCH 30-39 (nuo banglelėjimo pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas) 0,4 l/ha norma, arba BBCH 40-45 (nuo vamedelėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo lapamakės sustorėjimo) 0,5 l/ha norma.

Maksimalus purškimų skaičius per sezoną – 1.

Vasariniai kviečiai ir miežiai

Pixoxaro EC gali būti purškiamas BBCH 21-29 (nuo pirmojo šoninio ūgio iki krūmijimosi pabaigos) 0,25 l/ha norma, arba BBCH 30-45 (nuo banglelėjimo pradžios iki paskutinio lapo lapamakės sustorėjimo) 0,35 l/ha norma.

Maksimalus purškimų skaičius per sezoną – 1.

Augalai	Naudojimo norma	Purškimo laikas, BBCH	Poveikio lygiai ir piktžolių rūšys	
			95–100 % poveikis	85–95 % poveikis
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai ir kvietrugiai	0,25 l/ha	23–29 (nuo trečiojo šoninio ūgio iki krūmijimosi pabaigos)	Vaistinė žvirbljarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>) ir raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>)	Rugiagėlė (<i>Centaurea cyanus</i>), aguona birulė (<i>Papaver rhoeas</i>), daržinė žilugė (<i>Stellaria media</i>) ir dirvinė akle (<i>Galeopsis tetrahit</i>)
	0,4 l/ha	30–39 (nuo banglelėjimo pradžios iki išsiskleidžia paskutinis lapas)	Aukščiausi išvardinti: Kibisų lipikas (<i>Galium aparine</i>)	Aukščiausi išvardinti:
	0,5 l/ha	40–45 (nuo vamedelėjimo pradžios iki paskutiniojo lapo lapamakės sustorėjimo)	Aukščiausi išvardinti: Dirvinė akle (<i>Galeopsis tetrahit</i>) ir daržinė žilugė (<i>Stellaria media</i>)	Aukščiausi išvardinti: Trikerė žvagnė (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)
Vasariniai miežiai ir kviečiai	0,25 l/ha	21–29 (nuo pirmojo šoninio ūgio iki krūmijimosi pabaigos)	Kibisų lipikas (<i>Galium aparine</i>) ir vaistinė žvirbljarūtė (<i>Fumaria officinalis</i>)	Vijoklinis pelevirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>) ir daržinė žilugė (<i>Stellaria media</i>)
	0,35 l/ha	30–45 (nuo banglelėjimo pradžios iki paskutinio lapo lapamakės sustorėjimo)	Aukščiausi išvardinti: Raudonžiedė notrelė (<i>Lamium purpureum</i>), baltoji balanda (<i>Chenopodium album</i>) ir vijoklinis pelevirkštis (<i>Fallopia convolvulus</i>)	Aukščiausi išvardyti:

BBCH	Kulunorm	Efektīvsus ja umbrohuliigid		
		95-100% mōju	85-94,9% mōju	70-84,9% mōju
13-19	0,125 l/ha	Harilik punand (<i>Fumaria officinalis</i>) ja verev iminēģis ligiids (<i>Lamium spp.</i>)	Roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>)	
20-29	0,25 l/ha	Ūlaltoodud	Konnatatar (<i>Polygonum convolvulus</i>), vesihein (<i>Stellaria media</i>), valģe hanemalts (<i>Chenopodium album</i>) ja roomav madar ehk virm (<i>Galium aparine</i>)	
30-45	0,35 l/ha	Ūlaltoodud ja lisaks: Valģe hanemalts (<i>Chenopodium album</i>), vesihein (<i>Stellaria media</i>) ja konnatatar (<i>Polygonum convolvulus</i>)	Vesihein (<i>Stellaria media</i>)	Erilehine linnurohi (<i>Polygonum aviculare</i>)

Toote toime tugevdamiseks harilikul kesalille vastu taliteraviljas, suvidroas ja -nisus soovitame segada Pixxaro EC kokku 0,075 l/ha Primus –ga.

Muld

Herbitsiidi Pixxaro EC-d vōib kasutada erinevatel mullatūpidel.

Vihmakindlus

Herbitsiidi Pixxaro EC on vihmakindell tund aega pārst pritsimist.

Pritsimisvōtēd ja vee hulķ

Soovitatav pritsimiskogus on 100–400 liitrit vett hektari kohta. Madalaimat vee kogust kasutada kui taimik on hōre ja umbrohud vāikesed. Tiheda taimikuga pōlul on vajalik vee kogus 200-400 l/ha.

Pritsimislahuse valmistamine

Enne preparaateid kasutamist veenduge alati, et prits on korralikult puhastatud ning seal ei ole settejāake. See on eriti oluline, kui pritsi on kasutatud teistel kultuuridel. Loksuta toote kanistrit pōhjalikult enne avamist ja kasutamist. Tāida pritsipaak 1/2 puhta veega ja alusta segamist. Lisa vajalik kogus Pixxaro EC-d pritsipaaki. Loputa tūhja kanistrit veega ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Tāida paak veega ja kasuta tōolahas koheselt āra. Jātka segamist ka enne tōōd ja pritsimise ajal.

Kui pritsi tāitmisel vedelate preparaateidēga kasutatakse tankurseadet, valatakse preparaat esmalt tankurseadmisse ja seejāēri imetakse sealt paaki. Pārst preparaadi lisamist pritsi paaki tuleb tankurseade loputada, samuti ka tūhjād kemikaalimahutid.

Paagi puhastamine

Prits tuleb nii vāljast kui seest pōhjalikult puhastada. Loputusvesi pritsitakse tōōdeldud alale. Tūhjēnda paak. Pārst kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tūhjēnda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vāldida maapinna, pinna - ja pōhjaeeve reostumist. Pritsimislahuse jāgāid ja loputusvesi pritsitakse eelnevalt tōōdeldud alale. Soovitav on korrata paagi pesu ja puhastamist 2-3 korda. Loputusvesi pritsitakse sōites tōōdeldud alale.

Piezime.
Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistitus izdģiģus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei.

IEROBEŽOJAMĀS NEZĀJŪ SUGAS

Ziemas kvieģi, ziemas mieģi, rudģi, tritikāle

Kultūrauga attģstģbas stadija, preparāta deva, l/ha,	Iedarģibas lģmenis on nezāģu sugas		
	95–100% iedarģiba	85–94,9% iedarģiba	70–84,9% iedarģiba
AS 23-29 0,25 l/ha	Ārstniecģbas matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>)	Keraģuģ madara (<i>Galium aparine</i>), ģerāģģģas (<i>Geranium spp.</i>)	Asais akģis (<i>Galeopsis tetrahit</i>)
AS 30-39 0,4 l/ha	Ārstniecģbas matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), keraģuģ madara (<i>Galium aparine</i>), ģerāģģģas (<i>Geranium spp.</i>)	Parastā rudzpuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), asais akģis (<i>Galeopsis tetrahit</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>)	Zģda magone (<i>Papaver rhoeas</i>), ganu plģkstģģģ (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)
AS 40-45 0,5 l/ha	Ārstniecģbas matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>), sārtā panātre (<i>Lamium purpureum</i>), keraģuģ madara (<i>Galium aparine</i>), ģerāģģģas (<i>Geranium spp.</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>)	Ganu plģkstģģģ (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Parastā rudzpuķe (<i>Centaurea cyanus</i>), zģda magone (<i>Papaver rhoeas</i>), asais akģis (<i>Galeopsis tetrahit</i>),	Kartupelģs-sārgaugs (<i>Solanum tuberosum</i>)

Vasaras mieģi on vasaras kvieģi

Kultūrauga attģstģbas stadija, preparāta deva, l/ha	Iedarģibas lģmenis on nezāģu sugas		
	95–100% iedarģiba	85–94,9% iedarģiba	70–84,9% iedarģiba
AS 13-19 0,125 l/ha	Ārstniecģbas matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>) panātres (<i>Lamium spp.</i>)	Keraģuģ madara (<i>Galium aparine</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)	Parastā virza (<i>Stellaria media</i>), dārze vģģģģģģ (<i>Polygonum convolvulus</i>)
AS 20-29 0,25 l/ha	Ārstniecģbas matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>), panātres (<i>Lamium spp.</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>)	Keraģuģ madara (<i>Galium aparine</i>), dārzģ vģģģģģģ (<i>Polygonum convolvulus</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>), asais akģis (<i>Galeopsis tetrahit</i>)	

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Pixxaro EC galima naudoti 5–25 °C temperatūroje, tiek drėgnoje, tiek ir sausoje aplinkoje. Didelės sauros sąlygomis efektyvumas gali šiek tiek sumažėti. Nepurškite streso paveiktų pasėlių. Stresą gali sukelti daugelis veiksnių, įskaitant šalną, sausrą, užsistovėjusį vandenį, mikroelementų trūkumą, ligas, kenkėjų užpuolimus ir t. Kartais dėl Pixxaro EC pasėlis gali šiek tiek trumpam (2–3 sav.) pagelsti, tačiau tai neturi įtakos derliaus kiekiui ir jo kokybei.

MAIŠYMAS

Norint sustiprinti produkto efektyvumą naikinant ramunes (*Matricaria*) žieminiuose javuose, vasarinuose kviečiuose ir miežuose, rekomenduojame maišyti Pixxaro EC su Primus™ 0,075 l/ha.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimais žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

DIRVA

Pixxaro EC gali būti naudojamas bet kokio tipo dirvožemyje ir tampa atsparus drėgmei praėjus 1 valandai po panaudojimo.

SĖJOMAINA

Nėra jokio apribojimo rudenį sėjamiems augalams laukuose, pavasarį purkštuose herbicidu Pixxaro EC. Prieš sėjant ankštinės kultūras (pvz. dobilus, pupas) rekomenduojama suarti dirvą. Nėra jokio apribojimo kitiems sėjamiems žemės ūkio augalams.

ATSĖJIMAS

Sunykus pasėliui galima sėti javus, kukurūzus, miglinės žolės ir rapsus praėjus mėnesiui nuo Pixxaro EC purškimo.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Pixxaro EC sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos - haloksifenmetilas ir fluoksipiras. Pagal veikimo pobūdį haloksifenmetilas ir fluoksipiras yra sintetiniai auksinai (HRAC kodas O). Atsparumo išsivystymo rizika sintetiniams auksinams yra maža.

Siekiant išvengti piktžolių atsparumo atsiradimo, būtina griežtai laikytis rekomendacijų. - Taikykite integruotą piktžolių kontrolės sistemą. - Naudokite pilną rekomenduojamą herbicidų normą ir nurodytu laikui. - Neviršykite maksimalaus purškimo skaičiaus per sezoną – 1. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, naudokite kitokio veikimo pobūdžio produktą, priklausantį kitoms atsparumo grupėms pagal HRAC sistemą. - Panaudoję herbicidą, patikrinkite lauką, ar buvo sunaikintos piktžolės. Neleiskite piktžolėms dauginis vegetatyviškai ir sėklomis. Išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. Jei įtariate, kad prasto veikimo priežastis – išsivystęs atsparumas, informuokite apie tai registracijos savininko atstovus Lietuvoje.

PURŠKIMO TECHNIKA IR VANDENS KIEKIS

Pixxaro EC turi būti išpurškstas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniais lauko purkštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą. Rekomenduojamas purškimo kiekis yra 100–400 litrų vandens hektarui.

Mažesnis vandens kiekis turi būti naudojamas tik retuose pasėliuose.

TIRPALO PARUŠIOMAS

Prieš pradedant ruošti tirpalą, būtina įsitikinti, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti.

Kai naudojamas išmaišymo indas, pusę purkštuvo talpos užpildoma vandeniu. Tuomet į išmaišymo indą pripilamas reikiamas Pixxaro EC kiekis, kuris nusiurbiamas į purkštuvo talpą kartu su trūkstančiu kiekiu švaraus vandens. Vėliau išmaišymo indas turi būti gerai išskalaujamas. Skalavimo procedūrą kartoti tol, kol jame nebesimato Pixxaro EC likučių.

Pritsi vāline puhashamine

Pritsi ja traktori puhashamine peab toimuma samal pōllul, mida tōōdeldi vōi selleks ettenāhtud alal, kus on pesuvēē kogumise vōimalus. Kui te puhashate pritsi āšja tōōdeldud pōllul, on oluline, et prits oleks varustatud vajaliku seadmega ning et olemas oleks vajalik kogus vett.

Mārgaja

Ei ole vajalik Pixxaro EC puhul.

Jārgnevad kultuurid

Pritsimisjārgsel sūģsel pole pōllukultuuriē kūlvamīēle piiranguid. Soovitav on enne tundlike līikide kūlvamist, nt ristlik, lātsed, maad kūnda.

Ūmberkūlv

Kui kūlv ebaōnnestub, vōib asenduskuultuurina kūlvata teravilja, maisi, raiheina ja rāpsī ūks kuu pārst pritsimist.

Resistentsus

Toode	Tūip	Toimeained	HRAC-rūhm	Resistentsuse kujunemise risk
Pixxaro EC	HERBITSID	Metūūhālauksifeen Fluoksipūūr	O	Madal

Sāilitamine

Sāilitage anēm korralikult sūletuna lasteē kātesaamatus kohas.

Hoidke eemal gōrgetest temperatuurīdest.

Sāilitage ūksnes orģīnāalpākēdis temperatuurīvahēmikus 0°C kuni 30°C.

Hoida eemal tōiduainetēst, joogist ja loomasōōdast.

Tūhjad anumad

Tūhjad pākēdis loputada 3 korda puhta vēega ja vīa ohtlike jāātmete kogumiskohta. Taara kordvķasutamine on keelatud. Kemikaalijāģid anda ūle ohtlike jāātmete kāitlejale. Mahavalgunud preparaat koguda kokku absorbēēvā ainega spetsīalsēsse vastavalt marķeeritud anumasse ja anda ūle ohtlike jāātmete kāitlejale.

Tarnetingimused

Kōķ meie poolt tarnitavad tooted on kōrģe kvaliteediga ning me oleme kindlad nende sobīvuses. Kūid kuna mēil puudub kontroll nende sāilitamīē, kāitlemīē vōi kasutamīē ning īlmastikutingimustē ūle, ei vastuta firma erīnevate tōrģetulemustē ja tekkinud kahjustustē eest, mīlle on pōhjustanud toote ebaģģe kāitlemīē, īlmastik, muudatused kasutamīēmeetodēts jm, mida toote registrēerimīēsl polnud vōimalik ette nāha.

AS 30-45 0,35 l/ha	Ārstniecības matuzāle (<i>Fumaria officinalis</i>), panātres (<i>Lamium sp.</i>), baltā balanda (<i>Chenopodium album</i>), parastā virza (<i>Stellaria media</i>), dārze vēģrēķis (<i>Polygonum convolvulus</i>)	Keraiņu madara (<i>Galium aparine</i>), asaīs aklīs (<i>Galeopsis terrestris</i>)	Maura sūrene (<i>Polygonum aviculare</i>)
-----------------------	--	---	---

Lai nodrošinātu labu efektivitāti tīruma kumelēs (*Matricaria inodora*) ierobežošanā ziemas kviešu, ziemas miežu, tritikāles, rudzu, vasaras kviešu un vasaras miežu sējumos, ieteicams Pixxaro EC lietot tvērtēs maisījumā ar Primus 0,075 l/ha vai Pro 0,075 l/ha.

AUGSNE

Pixxaro EC var lietot jebkura veida augsnē.

LIETUS NOTURĪBA

Herbīcīds Pixxaro EC kļūst noturīgs pret lietu 1 stundu pēc lietošanas.

SMIDZINĀŠANAS TEHNIKA UN ŪDENS DAUDZUMS

Pixxaro EC smidzināšanai var izmantot jebkuru tipa smidzinātāju, kas ir kalibrēti un sagatavoti darbam saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Ieteicamais darba šķidruma patēriņš uz vienu hektāru ir 100-400 litri. Izmantojiet sprauslas un smidzināšanas metodes, kas ir vispiemērotākas attiecīgajam lībilas blīvumam un nezāļu lapu novietojumam. Minimālais darba šķidruma patēriņš bīlvā lībilā uz vienu hektāru ir 200 litri.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas šķidruma sagatavošanas vienmēr pārliecinieties, ka smidzinātājs ir akurāti iztīrīts un bez aplikuma. Tas ir īpaši svarīgi, ja pirms tam ir apsmidzināti citi kultūraugi.

Izmantojot darba šķidruma sagatavošanas tvērti

Lietojot darba šķidruma sagatavošanas tvērti, vispirms piepildiet to līdz pusei ar ūdeni, tad pievienojiet vajadzīgo Pixxaro EC daudzumu, kurš pēc tam tiek iesūkts smidzinātāja tvērtē, kamēr tīrais ūdens tiek pievienots darba šķidruma sagatavošanas tvērtē. Pēc tam izskalojiet darba šķidruma sagatavošanas tvērti un tukšās kānās. Atkārtot procedūru ar apakšējā vārsta atvēršanu/ aizvēršanu, kamēr vairs nav redzams Pixxaro EC atliekas tvērtē.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA

Smidzinātājiem ar darba šķidruma sagatavošanas tvērti

Smidzināšanas maisījumu atlikumiem un skalojamajam ūdenim ir jābūt izsmidzinātam uz lauka vai īpāsā skalošanas vietā neatkarīgi no smidzinātāju uzpildīšanas specifikas. Skalošanas tvērtēns ūdens atlikumam jābūt tīdam. Lai atlikušo smidzināšanas šķidrumu varētu atskaidīt vismaz 50 reizes. Izskalojiet smidzinātāja tvērti nekavējoties pēc skalojamā ūdens īepildīšanas, īzmantojot smidzinātāja tvērtēns skalojamās sprauslas. Tvērtēns skalošanas ūdens var tīkt sadalīt tā, lai atsevišķu skalošanu un izsmidzināšanu varētu veikt 2-3 reizes. Tvērtēns skalošanas šķidrumu izsmidzina šķērsojot apstrādāto lauku.

SMIDZINĀTĀJU TĪRĪŠANA NO ĀRPUSES

Smidzinātāja un traktora tīrīšana ir jāveic vai nu uz apstrādātās platības vai arī jāizmanto speciāls tīrīšanas laukums, kurā ir īerīkots atsevišķs atlikumu savākšanas konteiners. Tīrot smidzinātāju uz lauka, smidzinātājam ir jābūt aprīkotam ar nepieciešamajām mazgāšanas īekārtām, kā arī mazgājamā ūdens daudzumam jābūt pietiekamam.

VIRSMAS AKTĪVĀ VIELA

Pixxaro EC nav nepieciešama.

PĒCKULTŪRAS

Pēc apstrādes nav nekādu īerobežojumu citu kultūraugu audzēšanai rudenī. Āršana ir īeteicama pirms jūtīgu kultūraugu audzēšanas, īemēram, ābolīna, lēcam.

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS

Līķē nepurķstas tīrpalas bēī panaudotas purķstūvo plovīmūi vanduo turi būti īpurķstas ant to patīēs lauko, kur buvo naudotas purķstas.

Tīrpalō paruošimo talpa. Švāras vandens talpa turi būti tokio dydžio, kad līķēs tīrpalas būty priekīstas mažiausiai 50 kartū. īs karto po purķsmo, vidinīas purķstūkūais īplauti purķstūvo vīdy. Rekomēduojama švārū vandēnī īsdalīnti taip, kad purķstūvo talpos vīdy galīma būty īplauti 2-3 kartus. Skālāvimūi panaudotas vanduo turi būti īpurķstas ant to patīēs lauko, kur buvo panaudotas darbinīs tīrpalas.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Purķstūvo ir traktorīas plovīmas turi būti atliekamas tame pačiame lauke, kur buvo purķīamās tīrpalas. Tokiū atvejū purķstūvas turi turēti tam skīrtā įrangā bēī pakankamā švāras vandens talpā. Purķstūva galīma plauti ir spēcīoje tam skīrtoje purķstūvū plovīmo aīķstēlēje, turīnčioje paplavū surīkīmo talpā.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkancią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvēti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkancias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitrilo (≥0,4 mm), chloropreno (≥0,5 mm), butilo (≥0,7 mm) ar kt. Būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkancias standartą LST EN 166).

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų, avėti tvirtą avalynę bei mūvēti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. **Darbuotojams** eiti į apdorotus plotus galima tik įiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvēti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerbti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis nekvepti riko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš praeitauks nusīvilti drabužius, nusīpraust vandeniu su muilu. Daro drabužius laikyti atskīrai. Užterštus drabužius īsskalbti prieš vėl juos apīveikant. Sūstītepus pīrštīnū pavīvū, įas reīkia kruopščīai nuplauti. Jei neįmanoma īsvalyti asmenīnīų apsaugos pīrmoniū, būtīna sunaīkinti laikantis galiojančių teisēs aktū reikalavīmū.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: īsvesti asmenį į gryną orą. Pasijutusi blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuīvilti sūterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirģinīmas nepraēina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akīs: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakēlus akiū vokus 10 – 20 minucīų. Įeigu neįsīojami, īsīmti kontaktīnīus lēģius ir toliau plauti. Jei dirģinīmas nepraēina, kreiptis į gydytoją. **Praėjus:** Jei nukentējusysis sāmōnīngas: skālauti burnā vandeniu, duoti īsgerī stīklīnį (250 ml) vandens. Neskatīnti vēmīmo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuoētē arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus pīešnuodžio nēra. Taikyti simptomīnīų gydymā

Apsīnuodījimo atvejū kreiptis į Apsīnuodījīmū kontrolēs ir īnformācijas būrā telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

SAUGOJIMAS

Preparatā laikyti sandariūi uždarītoje pakuoētėje toliau nuo aukštōs temperatūros šaltīnio. Laikyti tik orģīnalioje pakuoētėje, temperatūra laikymo metu turi būti 0°C – +30°C. Laikyti vaikams nepasīekiamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo maīsto, gērīmū ir gyvūlū pašaro.

PĀRSĒJA

Gadījumā, ja ar Pixxaro EC apstrādātais kultūraugs ir gājis bojā, jāveic augšnes apstrāde un jānogaida viens mēnesis. Pārsēt drīkst vasarāju graudaugus, kukurūzu, rapsi vai aiezeni.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS RISKA IEROBEŽOŠANA.

Produkts	Tips	Aktīvā viela	HRAC grupa	Rezistences veidošanās risks
Pixxaro EC	HERBICĪDS	Metil-halauksifēns, fluroksipirs	O	Zems

Ievērojiet vispārējās rezistences veidošanās riska ierobežošanas principus:

- ievērojiet herbicīdu lietošanas rekomendācijas- lietošanas devu un laiku;
- sekojiet herbicīdu iedarbības rezultātiem uz lauka;
- nezaļļu ierobežošanā izmantojiet agrotehniskos un mehāniskos līdzekļus.

TUKŠĀ TARA

Preparāta iepakojums ir jāizmazgā ar ūdeni 3 reizes un mazgājamais ūdens izmantojams darba šķidruma pagatavošanai. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. Iepakojumu nedrīkst lietot atkārtoti. Tas jāuzglabā speciāli iekārtotā vietā un to likvidē ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt slēgtā, oriģinālā iepakojumā, bērniem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30 °C.

Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

VIDES AIZSARDZĪBA

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsgāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Visi mūsu piegādātie produkti ir augstas kvalitātes un mēs esam pārliecināti par to piemērotību lietošanai, taču tā kā mēs nevaram nodrošināt kontroli pār uzglabāšanu, transportēšanu, jaukšanu un lietošanu, kā arī par laika apstākļiem pirms apstrādes, apstrādes brīdī un pēc apstrādes, kas var ietekmēt produkta iedarbības efektivitāti, visi nosacijumi un garantijas, likumā noteiktās vai citas, attiecībā uz mūsu produkta kvalitāti vai piemērotību jebkādai tā lietošanai, nav ietverti. Ne mēs, ne mūsu tirdzniecības partneri neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies produkta nepareizas uzglabāšanas, transportēšanas vai lietošanas rezultātā. Šos nosacijumus nevar mainīt ne mūsu darbinieki, ne pārstāvji, neatkarīgi no tā, vai tie pārrauga vai piedalās produktu lietošanā.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvo talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

PASTABA

Visi mūsų tiekiami produktai yra labai aukštos kokybės. Tačiau gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, jei produktas buvo netinkamai saugotas, maišomas, ar oro sąlygos prieš, po ar produkto naudojimo metu nepalankios purškimui.

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

EE

Hoiatus

EUH401: Inimeste tervise ja keskkonnaohutuse vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H410 Väga mürgine veeoranismsidele, pikaajaline toime.

P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastusi/kaitseprille/kaitsemaski.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL. Pesta rohke veega ja seebiga.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL.

Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pööruda arsti poole.

P373+P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pööruda arsti poole.

P362+P364 Votta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seedmiste pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SP3 Veooranismside kaitsemiseks pida kinni mittepritsitavast puhvervõrdsist 5 m pinnaveekogudest.

Mittesihimärgitavate kaitsemiseks pida kinni mittepritsitavast puhvervõrdsist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Kasutuspiirang: Pixxaro EC ei tohi kasutada lähemal kui 5 m pinnaveekogudest ja lähemal kui 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Esmaabi

Üldteave: Kasutada isikukaitsevahendeid. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi. **Sissehingamisel:** Toimetada kannatanu viivitamatult värske õhu kätte. Pööruda arsti poole.

Nahale sattumisel: Votta seljast saastunud riided. Pesta nahka rohke vee ja seebiga 15-20 minutit. Tööriistu pesta enne taaskasutust. Helista mürgistusabi keskusesse või abi saamiseks arstile. Peske riided enne taaskasutamist.

Silma sattumisel: Hoidke silmad lahti ja loputage aeglaselt ja ettevaatlikult veega 15-20 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse pärast esimest 5 minutit ja seejärel jätkake loputamist silmad. Abi saamiseks pööruda mürgistusabikeskusesse või arsti poole. **Allaneelamisel:** Loputada suud. Pööruda arsti poole. **HÄDAABI TELEFON 112. MÜRGISTUSABEKESKUSE LÜHINUMBER 16662**

**Uzmanību**

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H335 Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/smīdinājumus.

P280 Izmanto aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu.

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACIM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalo.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet medicīn palīdzību.

P501 Atbīrītības no satura/vertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības

SP1 Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpniņu un ūdenstēzē tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SP3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstēzēm.

SP3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesatīstus izdīgus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojami zemei.

Avārijas gadījumā zīpot ugunsdzēsības zemes glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana. Uzglabāt slēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no pārkaršanas. Uzglabāt temperatūrā no 0 līdz 30 °C. Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT

ATSARGIAI

Gali sukelti alerģinę odos reakciją.

Sukelia smarki akių dirginimą.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Nusivilioti užterštus drabužius ir išskalti prieš vėl juos apsišveikinti.

Sulinkyti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinoti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuočių (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio)/vengti taršos per dreną iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonais:

8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

CORTEVA
agriscience

Pixxaro™ EC
Arylex™ active

HERBITSIID/HERBICĪDS/HERBICIDAS

™Trademarks of Corteva, Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

EE

Pixxaro EC on süsteemne lehtede kaudu mõjuv herbitsiid laialeheliste (kaheleheliste) umbrohtude tõrjeks talinuis, taliodras, rukkis, tritikales, suvinuis ja suvidoras.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

metüülhalauksifeen 12,5 g/l (halauksifeenina 12 g/l; fluoksüüpüür 280 g/l (meptüülfluoksüüpüürina 403 g/l), metüülklokvintoseet (taimekaitseaine)

12 g/l Sisaldab N,N-dimetüülürasvhapete amiide.

Preparaadi vorm: emulsioonikonsentraat

Eesti reg. nr.: 0616/07.06.16

Valmistamise aeg: valmistatud pakendit

Partii nr.: vaata pakendit

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Registreerimise haldaja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhagen K, Dänija

Taanil. Tel: +45 45 28 08 00



LV

Pixxaro EC on süsteemne lehtede kaudu mõjuv herbitsiid laialeheliste (kaheleheliste) umbrohtude tõrjeks talinuis, taliodras, rukkis, tritikales, suvinuis ja suvidoras.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

metüülhalauksifeen 12,5 g/l (halauksifeenina 12 g/l; fluoksüüpüür 280 g/l (meptüülfluoksüüpüürina 403 g/l), metüülklokvintoseet (taimekaitseaine)

12 g/l Sisaldab N,N-dimetüülürasvhapete amiide.

Preparaadi vorm: emulsioonikonsentraat

Eesti reg. nr.: 0616/07.06.16

Valmistamise aeg: valmistatud pakendit

Partii nr.: vaata pakendit

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Registreerimise haldaja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhagen K, Dänija

Taanil. Tel: +45 45 28 08 00



LT

Pixxaro EC on sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių dviskelių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, miežių, rudų, tritikales, vasaros kviečių ir vasaros miežių sėjoms.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

metüülhalauksifeen 12,5 g/l (halauksifeenina 12 g/l; fluoksüüpüür 280 g/l (meptüülfluoksüüpüürina 403 g/l), metüülklokvintoseet (taimekaitseaine)

12 g/l Sisaldab N,N-dimetüülürasvhapete amiide.

Preparaadi vorm: emulsioonikonsentraat

Eesti reg. nr.: 0616/07.06.16

Valmistamise aeg: valmistatud pakendit

Partii nr.: vaata pakendit

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Registreerimise haldaja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhagen K, Dänija

Taanil. Tel: +45 45 28 08 00



Pixxaro EC yra sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienmečių dviskelių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, miežių, rudų, tritikales, vasaros kviečių ir vasaros miežių sėjoms.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeained:

metüülhalauksifeen 12,5 g/l (halauksifeenina 12 g/l; fluoksüüpüür 280 g/l (meptüülfluoksüüpüürina 403 g/l), metüülklokvintoseet (taimekaitseaine)

12 g/l Sisaldab N,N-dimetüülürasvhapete amiide.

Preparaadi vorm: emulsioonikonsentraat

Eesti reg. nr.: 0616/07.06.16

Valmistamise aeg: valmistatud pakendit

Partii nr.: vaata pakendit

Säilivusaeg: 2 aastat

Tootja/pakendaja: Dow AgroSciences SA

Registreerimise haldaja:

Corteva Agriscience Denmark A/S,

Langebrogade 1,

DK-1411 Kopenhagen K, Dänija

Taanil. Tel: +45 45 28 08 00



NETOKOGUS/ NETO/ GRYNASIS KIEKIS:5 L