

UFI: EX49-60TV-S00Q-DQGR

Färoangivelser:

H315 - Irriterar huden.

H318 - Orsakar allvarliga ögonskador.

H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Skyddsangivelser:

P280 - Använd ögonskydd och skyddshandskar.

P319 - Samla upp spill.

P264 - Tvätta händerna grundligt efter användning.

P501 - Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Första hjälpen:

P305+P351+P338 +P310 - VID KONTAKT MED ÖGONEN:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella

kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Se även produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 4.

Personlig skyddsutrustning:

Ögonskydd och skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Arbetskläder (som täcker armar, ben och bål) ska användas vid återinträde i behandlade områden under 75 dagar efter behandling.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.



278818

2403

I de fall utrustning som reducerar avdriften krävs ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov duschkvalitet.

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

Univoq™
Inatreq™ active

SVAMPMEDEL



FARA

Särskilda miljörisker:

SP1 - Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av «Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom».

Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas.

NETTOMÄNGD: 5 L



Univoq™
Inatreq[®] active



SVAMPMEDEL

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 5954

GROUP

21

3

FUNGICIDE

UFI: EX49-60TV-S00Q-DQGR

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Mot svampangrepp i odlingar av höstvet, durumvet, speltvet, hösträgvete, höstråg, vårvete, vårrägvete, vårråg.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Innehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark, tlf. +45 45280800

Importör: Corteva Agriscience AB, Box 7199, 103 88 Stockholm, www.corteva.se

™ Trademarks of
Corteva Agriscience
and its affiliated
companies



278822

2403

Övriga villkor:

Produkten ska skakas före användning.

Verksamma beståndsdelar:

Fenpicoxamid 50 g/l (4,8 % w/w)
Protrioconazol 100 g/l (9,6 % w/w)
Innehåller: N,N-dimetyloktanamid
Beredningsform: emulgerbart
koncentrat (EC).

Lagring: Förvaras frostfritt och i
tillsluten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning
får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag:
Se behållaren. Hållbar minst 2 år
från tillverkningsdatum.

MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK (for 2D Data Matrix,
Lot Nr., Manufacturing Date ...)

NETTOMÄNGD: 5 L

Bruksanvisning

Univoq har en foliär aktivitet mot ett brett spektrum av spannmålssjukdomar. Univoq har en överlägsen effekt på svartpricksjuka, brunfläcksjuka och gulrost, samt god effektkornrost (vete, råg & rågvete), vetets bladfläcksjuka (DTR), mjöldaggssvampar och sköldfläcksjuka. Moderat effekt uppnås på Fusarium och även viss effekt på stråknäckare.

Verkningsätt

Univoq är en skyddande och kurativ fungicid med translaminära egenskaper för kontroll av en rad sjukdomar i alla sorter av vete och durumvete, spelt, råg och rågvete, inklusive gränsådd. När Univoq appliceras på grödan, binder det till det kutikulära växet, förblir stabilt och fungerar som en materialreservoar och tränger med tiden in i bladen vilket ger en mycket god långsiktig kontroll av sjukdomar.

Användning

Univoq kan användas med en maximal mängd av 1,5 l/ha per behandling. Max en behandling per säsong.
Den tidigaste appliceringstidpunkten är BBCH 30 (början av stjälkens förlängning). Den senaste appliceringstidpunkten är BBCH 69 (slutet av blomning).
Den idealiska tidpunkten för applicering är att applicera i en skyddssituation.
Applicera Univoq under goda odlingsförhållanden. Undvik applicering på stressade grödor.

Non-printed area on
page 2 ONLY
Label A-code +
barcode area

Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area
printed on the front page)

Doseringstabell

Gröda	BBCH	Sjukdomskontroll	Dos (l/ha)	Kommentarer
Höst- och vårvete Durumvete Spelt med och utan insådd av gräs.	30–69	Utmärkt kontroll Svartpricksjuka, gulrost Brunfläcksjuka (LEPTNO) God kontroll Vetets bladfläcksjuka, Vetebrunrost (PUCCRT) mjöldagg. Moderat kontroll Fusarium.	1 x 1,5	För kontroll av vetets svartpricksjuka kan dosintervallet 1,2–1,5 l/ha användas. 1,2 l/ha vid låga infektionsförhållanden av vetets svartpricksjuka.
Höst- och vårråg med och utan insådd av gräs.	30–69	God kontroll Brunrost (PUCCRE) Sköldfläcksjuka, mjöldagg. Brunfläcksjuka (LEPTNO) Moderat kontroll mjöldagg		
Höst- och vårrågvete med och utan insådd av gräs.	30–69	Utmärkt Kontroll Svartpricksjuka. Brunfläcksjuka (LEPTNO) Good control Gulrost, Rågbrunrost (PUCCRT) mjöldagg. Moderat kontroll Fusarium		

Jordtyper

Univoq kan användas på alla jordtyper.

Klimatförhållande vid användning

Applicera Univoq under goda odlingsförhållanden. Undvik applicering på stressade grödor.

Regnfasthet

När sprutvätskan har torkat in.

Efterföljande gröda

Inga restriktioner för efterföljande grödor vid en normal växtföljd.

Omsådd

Inga restriktioner vid omsådd.

Vätmedel

Inget behov av vätmedel / tillsatsmedel.

Blandningar

Univoq kan tankblandas med relevanta växtskyddsmedel.

Spruteteknik och vätskemängd

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Broschyren finns på www.sakertvaxtskydd.se. Vid spridning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken ska utrustning som reducerar avdriften med minst 75 % användas. I de fall utrustning som reducerar avdriften krävs ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för grov doskvalitet.

Univoq ska appliceras med en växtskyddsspruta, som är kalibrerad och uppfyller den standard och specifikation som uppges av sprutillverkaren. Rekommenderad mängd vatten vid behandling är 100 till 300 liter vätskemängd per hektar. Använd en spruteteknik som är anpassad för ogräsets storlek och bladställning. För att säkerställa god nedträngning i täta grödor rekommenderas låg hastighet och minst 200 vätskemängd l/ha.

Beredning av sprutvätska

Se alltid till att sprutan är ordentligt rengjord från rester och beläggningar samt kontrollerad före det att tillredning av sprutvätskan påbörjas. Detta gäller särskilt om sprutan har använts för sprutning i andra grödor. Produkten ska skakas före användning. Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. Sprutvätskan ska vara under omrörning vid tillredning fram till sprutningsarbetet är avslutat. Fyll halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd preparat. **Preparatpåfyllare:** Vid användning av preparatpåfyllare, fylls halva behållaren med vatten och därefter tillförs önskad mängd av preparat. Därefter sugs vätskan upp i sprutan samtidigt som rent vatten tillförs. Efteråt sköljs preparatpåfyllaren, och eventuellt tomt emballage. Upprepa processen med att öppna och stänga preparatpåfyllarens bottenventil tills inga synliga spår av preparatet finns. **Preparatdoserare:** Vid användning av preparatdoserare hänvisas användaren till sprutillverkarens rekommendationer.

Invändig rengöring av sprututrustning vid avslutad/byte av sprutning

Observera! Eventuell sköljvattentank bör vara av sådan storlek att sprutvätskan kan utspädas minst 50 gånger. Var speciellt uppmärksam på att få rengjort alla invändiga detaljer grundligt. Aktivera alla slangar och ventiler samt öka trycket så att övertrycksventilen från det självrengörande filtret utlöser. Detta gäller under alla rengöringsprocesser.

- Starta med att tömma sprutan helt innan rengöring. Rester av sprutvätskan samt sköljvattnet ska sprutas ut på den behandlade arealen.
- Genom de invändiga spolmunstyckena tvättas spruttanken invändigt, skölj även slangar och ramp strax efter sprutarbetets avslutning med rent vatten. Detta ska upprepas 2-3 gånger.
- Fyll vatten i tanken – 10-15% av tankkapaciteten (100-150 liter vatten i en 1000 liters tank) och tillsätt 0,5 liter All Clear¹ Extra eller liknande produkt i rekommenderad dosering/ 100 liter vatten. Spruta lite av sköljvattnet ut genom slangar, ramp och munstycke så de blötlägges. Låt tankspolmunstycke vara i drift under minst 15 minuter. Töm därefter sprutan genom ramp och munstycken över tidigare besprutad areal under körning.
- Munstycke, filter och silar monteras av och tvättas i vatten, tillsätt 50 ml All Clear Extra/ 10 liter vatten.
- Skölj tanken och alla slangar grundligt i 5 minuter med rent vatten. Sköljvattnet sprutas ut genom ramp och munstycke.

Utvändig rengöring av sprutor

Rengöring av spruta och traktor (sprutekipage) måste göras på det behandlade området, biobädd eller på en påfyllnings/tvättplats med uppsamling av tvättvatten i flytgödselbehållare eller annan behållare. Rengöring på det behandlade området kräver växtskyddsspruta försedd med tvättutrustning och att vattenkapaciteten är tillräcklig.

Resistensstrategi

Produkt	Typ	Aktiv substans	HRAC grupp	Risk för resistensutveckling
Univoq	FUNGICID	Fenpicoxamid	C4#21	Medel till Hög
		Prothioconazole	G1#3	Medel

Univoq är en samformulerad mix av fenpicoxamid och protriokonazol. Fenpicoxamid tillhör FRAC grupp C4 #21. Fenpicoxamid är inte kors-resistent till någon av de kommersiella fungiciderna som idag används på marknaden i spannmål. Univoq innehåller också protriokonazol, som är medlem i DMI fungiciderna. Behandla målsjukdomen enligt instruktion med Univoq i det specifikt indikerade växtstadiet. Använd Univoq som en del i Integrated Crop Management (ICM) strategin. Besök FRAC's hemsida för mer förebyggande råd gällande resistens i stråsäd.

Lagring

Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning

Tomma emballage

De tomma flaskorna sköljs ordentligt med vatten minst tre gånger. Sköljvattnet häller man i sprutan. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska enligt överenskommelse lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar.

Observera att förpackningarna ska sköljas ordentligt minst 3 gånger och ställas upp och ned under minst 30 sekunder för avrinning. Företaget är anslutet till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar (www.svepretur.se).

Corteva Agriscience AB är medlem av Svenskt Växtskydd.

¹ Varumärke – FMC



3 362130 187639 >



Univoq™
Inatreq™ active

SVAMPMEDEL

Bekämpningsmedel klass 2L - Reg. nr 5954

GROUP 21 3 FUNGICIDE

UFI: EX49-60TV-S00Q-DQGR

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påta oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK

Läs medföljande anvisningar före användningen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE:

Mot svampangrepp i odlingar av höstvet, durumvet, speltvet, höstrågvete, höstråg, vårvete, vårrågvete, vårråg.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Innehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark, tlf. +45 45280800

Importör: Corteva Agriscience AB, Box 7199, 103 88 Stockholm, www.corteva.se

™ Trademarks of
Corteva Agriscience
and its affiliated
companies



278822

2403

Övriga villkor:

Produkten ska skakas före användning.

Verksamma beståndsdelar:

Fenpicoxamid 50 g/l (4,8 % w/w)
Protiokonazol 100 g/l (9,6 % w/w).

Innehåller: N,N-dimetyloktanamid
Beredningsform: emulgerbart koncentrat (EC).

Lagring: Förvaras frostfritt och i tillsluten förpackning.

Tomemballage: Tom förpackning får inte återanvändas.

Satsnummer och tillverkningsdag: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

NETTOMÅNGD: 5 L