



ZorvecTM
active

Una vite al top.

Sulla tua vite è il momento di **ZorvecTM VinabelTM** e **ZorvecTM VinabriaTM**, i gioielli di **CortevaTM Agriscience**, il leader nella viticoltura.

Coltivare uva di qualità, anche nelle annate più difficili; contenere i costi di produzione; soddisfare le stringenti richieste di un mondo che cambia; agire per la sostenibilità. Con **CortevaTM Agriscience**.

Preziosi perché dentro hanno Zorvec™ active.

La preziosità di **Zorvec™ Vinabel™** e di **Zorvec™ Vinabria™** non risiede solo nella loro imbattibile efficacia ma nel fatto che sono **miscele pronte all'uso, le uniche sul mercato.**

La combinazione delle sostanze attive offre un'ineguagliabile uniformità d'azione e controllo delle malattie causate da funghi oomiceti, come la peronospora, per favorire il massimo del raccolto e del business.

Non presentano resistenza incrociata con i fungicidi presenti sul mercato.

Le soluzioni già pronte all'uso, applicate preventivamente e secondo etichetta, proteggeranno le piante nel periodo che va dalla pre-floritura fino allo sviluppo di grappoli e foglie, comprese quelle che al momento delle applicazioni non hanno raggiunto neppure il 20% della loro dimensione finale.

ZORVEC™
Vinabel™

FUNGICIDA

ZORVEC™
Vinabria™

FUNGICIDA

Zorvec™ Vinabel™			Zorvec™ Vinabria™	
Sostanza attiva	Zorvec™ active Oxathiapiprolin	Zoxamide	Zorvec™ active	Folpet
	Oxathiapiprolin		Oxathiapiprolin	
Classificazione FRAC	Gruppo 49 (F9)	Gruppo 22	Gruppo 49 (F9)	Gruppo M04
Dose	0,5 L/ha		2 L/ha	

Gli incomparabili benefici di Zorvec™ Vinabel™ e di Zorvec™ Vinabria™.

NESSUNA RESISTENZA INCROCIATA

con gli altri fungicidi in commercio



- Combatte efficacemente la peronospora della vite.
- Assicura una migliore efficacia e una maggiore durata del controllo.

RESISTENZA AL DILAVAMENTO

dopo meno di un'ora dall'applicazione



- Flessibilità d'applicazione: utile quando le condizioni climatiche incidono sull'epoca d'intervento.
- Evita di fare ripetere il trattamento in caso di pioggia.

PROTEZIONE DEI NUOVI GERMOGLI

protezione fino a 14 giorni



- Movimento sistemico acropeto verso foglie, germogli e grappoli.
- Essenziale per massimizzare la protezione della coltura e la sua resa.
- Consentono di ottimizzare gli interventi, contenendo i costi dei trattamenti.

Attiva la gestione delle resistenze.


Preservare l'attività biologica di ogni principio attivo è fondamentale in un'ottica di sostenibilità e di buona gestione dei prodotti in commercio.

Leggi nella tabella sottostante alcune raccomandazioni.

Strategia	Tattiche
Limitare l'esposizione	• Limitare il numero di applicazioni seguendo le indicazioni di etichetta, non eccedendo mai 2 applicazioni a stagione. • Preferire applicazioni in blocchi. • Applicare preventivamente. • Rispettare sempre l'intervallo di applicazione raccomandato. • Si consiglia di effettuare un numero di trattamenti non superiore ad un terzo del numero totale di applicazioni con prodotti fitosanitari ad azione antiperonosporica.
Rallentare la crescita del patogeno	• Adottare le buone pratiche agronomiche nella scelta del principio attivo in base allo stadio fenologico della pianta e in base alle condizioni meteorologiche.
Contenere gli isolati resistenti: • Ridurre la sopravvivenza • Ridurre la diffusione	• Dopo due applicazioni di Zorvec trattare con un prodotto a diverso meccanismo d'azione, possibilmente dotato di attività curativa. • Utilizzare Zorvec nella prima metà della stagione.


Posizionamento tecnico.

Zorvec™ Vinabel™ e **Zorvec™ Vinabria™** sono indicati per il controllo della Peronospora (*Plasmopara viticola*) dell'uva da vino e da tavola, con un blocco di **due applicazioni consecutive effettuate preventivamente nel periodo dalla pre-fioritura** (10 giorni prima dell'inizio della fioritura) **alla fioritura**, seguendo un intervallo di 10-14 giorni. In questo modo, puoi arrivare fino a 28 giorni di protezione nella fase fenologica della fioritura, che rappresenta lo stadio più suscettibile alla patologia.



Attività translaminare e sistemica acropeta.

Nei test effettuati la pagina superiore della foglia è stata trattata nell'area "A", mentre quella inferiore è stata inoculata con il patogeno. Si sono poi valutati gli effetti. Come mostrano le fotografie, a differenza dei competitori, il movimento translaminare assicurato sia da **Zorvec™** **Vinabel™** che da **Zorvec™** **Vinabria™** protegge la superficie inferiore della foglia. Inoltre, il movimento sistemico acropeto nei tessuti della foglia ne consente una copertura uniforme (area "B").



Zorvec™ Vinabel™



Standard 1



Standard 2



Standard 3



Studi su piante intere, centro europeo di ricerca e sviluppo DuPont, Francia.

Vedi? Questo è l'innovativo effetto active.



Visita il sito corteva.it

UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL'APPLICAZIONE. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Per la composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. ® ™ Marchi di Corteva Agriscience e compagnie affiliate. © 2022 Corteva.