

Univoq™

Inatreq™ active

NOVO!

FUNGICID

Zaštitite svoj usjev, farmu i budućnost.



Univoq™

Inatreq™ active

FUNGICID

Novo, jedinstveno rješenje
za fleksibilnu i potpunu kontrolu
bolesti žitarica



Aktivne tvari:

fenpikoksamid
(Inatreq™ active) – 50 g/l
protriokonazol – 100 g/l



Formulacija:

koncentrat za emulziju (EC)



samo za profesionalne
korisnike



Koje su praktične prednosti?

- Jedinstven, otporan i fleksibilan fungicid
- Nova aktivna tvar fenpikoksamid, novo mjesto djelovanja
- Odlična kontrola Septoriae
- Kontrola drugih važnih bolesti žitarica
- Protektivno i kurativno djelovanje
- i-Q4™ tehnologija osigurava gotovo 100 % pokrivenosti lista i nudi dugotrajnu zaštitu
- Nema križne rezistentnosti

optimizirano
i-Q4™
tehnologijom

Kultura	Bolest	Doza	Vrijeme primjene
ozima pšenica, ozima tvrda pšenica i ozimi pir	za suzbijanje pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>), žutosmeđe pjegavosti lišća pšenice (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), paleži klasa (<i>Fusarium spp.</i>), smeđe hrđe pšenice (<i>Puccinia triticina</i>) i žute hrđe (<i>Puccinia striiformis</i>)	1,5–2 l/ha	kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30–69)
jara pšenica, jara tvrda pšenica i jari pir	za suzbijanje pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>), žutosmeđe pjegavosti lišća pšenice (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), paleži klasa (<i>Fusarium spp.</i>), smeđe hrđe pšenice (<i>Puccinia triticina</i>) i žute hrđe (<i>Puccinia striiformis</i>)		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30–69)
ozima pšenoraž	za suzbijanje žute hrđe (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđe hrđe (<i>Puccinia triticina</i>), paleži klasa (<i>Fusarium spp.</i>) i pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>)		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30–69)
jara pšenoraž	za suzbijanje žute hrđe (<i>Puccinia striiformis</i>), smeđe hrđe (<i>Puccinia triticina</i>), paleži klasa (<i>Fusarium spp.</i>) i pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>)		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30–69).
ozima raž	za suzbijanje pjegavosti lista (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđe hrđe (<i>Puccinia recondita</i>), žute hrđe (<i>Puccinia striiformis</i>) i pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>)		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30–69).
jara raž	za suzbijanje pjegavosti lista (<i>Rhynchosporium secalis</i>), smeđe hrđe (<i>Puccinia recondita</i>), žute hrđe (<i>Puccinia striiformis</i>) i pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>)	2 l/ha	kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30–69)
ozima pšenica, ozima tvrda pšenica, ozima pšenoraž i ozimi pir	za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (<i>Zymoseptoria tritici</i>)		kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja do završetka cvatnje (BBCH 30–69)



Koje savjete slijediti prilikom primjene?

- Dobro se miješa s herbicidima (Pallas™, Corello™ DUO)
- Ne tretirati po vjetrovitom vremenu
- Sredstvo je preporučljivo primjenjivati preventivno ili najkasnije u početnim

fazama razvoja bolesti te
izbjegavati kurativnu
primjenu sredstva

Posjetite nas na Corteva.hr

™® Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience
i njezinih povezanih društava. © 2022 Corteva