

Prigrlite uravnoteženu budućnost.





Sadrži:
*Methylobacterium
symbioticum*



Formulacija:
vodotopivo prašivo (WP)



samo za profesionalne
korisnike



Koje su praktične prednosti?

- Povećava učinkovitost, iskoristivost i dostupnost hranljivih tvari fiksacijom atmosferskog dušika
- Sadrži ekskluzivni soj *Methylobacterium symbioticum* SB23, bakterije za fiksiranje dušika koju karakterizira njena sposobnost da fiksira atmosferski dušik i transformira ga u izvor dušika koji biljka može asimilirati
- Nakon primjene, bakterije prisutne u proizvodu UTRISHA® N brzo koloniziraju filozferu biljke, a zatim se razmnožavaju tijekom ciklusa same biljke
- UTRISHA® N pruža novi prirodni izvor dušika za uzgoj kroz simbiotsku fiksaciju
- UTRISHA® N se primjenjuje folijarno
- Proizvod se nanosi u dopodnevnim satima kako bi se olakšalo prodiranje bakterija u tkivo biljke. Preporuča se primjena u razdoblju maksimalnog otvaranja puči na temperaturama između 10 i 30°C

Kultura	Doza	Vrijeme primjene
Ozime žitarice	333 g/ha	Primijeniti od sredine busanja (BBCH 25) do početka cvatnje (BBCH 61)
Jare žitarice		Primijeniti od sredine busanja (BBCH 25) do kada je drugi nodij najmanje 2 cm iznad prvog nodija (BBCH 32)
Ozima i jara uljana repica		Primijeniti od stadija razvijenih 6-8 listova u jesen (BBCH 16-18) i u proljeće od stadija rozete (BBCH 30) do kraja cvatnje (BBCH 69)
Suncokret, kukuruz, soja, mahunarke i sirak		Primijenite od stadija 4 lista razvijena do 8 razvijenih listova (BBCH 14 – 18)
Vinova loza	500 g/ha	Primijeniti od stadija pupoljaka (BBCH 51) do početka cvatnje (BBCH 61)
Maslina	333-500 g/ha	Primijeniti od stadija početka rasta mladica (BBCH 31) do stadija početka cvatnje (BBCH 61)

UTRISHA® N uspješno se primjenjuje i u slijedećim kulturama: blitva, češnjak, artičoka, celer, brokula, luk, zeleni luk, kupus, cvjetača, endivija, bijele šparoge, zelene šparoge, špinat, grašak, mahune, slatka repa, komorač, zelena salata, dinja, poriluk, rotkvica, Romanesco brokula, lubenica i mrkva, krumpir, jagoda, borovnica, malina, kupina, ribizl, brusnica, patlidžan, tikvica, krastavac, paprika, ljuta paprika i rajčica, lucerna, livade i pašnjaci, stabla orašastih plodova, koštičavih voćaka, jezgričavih voćaka i agruma u dozi 333-500 g/ha