

VerbenTM

NOVO!

FUNGICID

Novi fungicid za žitarice širokog spektra djelovanja, za poboljšanu kontrolu bolesti, veće prinose i kvalitetu.

BUDITE PONOSNI DOKLE VAM POGLED SEŽE!



Verben™

FUNGICID

Novi fungicid s kontaktnim i sistemčnim djelovanjem, za preventivnu i kurativnu upotrebu u suzbijanju uzročnika glavnih bolesti u usjevima žitarica



Aktivne tvari:

prokinazid – 50 g/l
protriokonazol – 200 g/l



Formulacija:

koncentrat za emulziju (EC)



samo za profesionalne korisnike



Koje su praktične prednosti?

- Širok spektar djelovanja, tehnologija formulacije za superiornu učinkovitost u polju
- Mnogo bolja efikasnost u odnosu na čisti protriokonazol
- Izuzetno djelovanje na pepelnicu zbog sinergije između prokinazida i protriokonazola
- Odlično djelovanje u različitim vremenskim uvjetima
- Snažan utjecaj na prinos

Kultura	Bolest	Doza	Vrijeme primjene
ozima i jara pšenica, ozima pšenoraž	za suzbijanje uzročnika parazitskog polijeganja (<i>Oculimacula yallundae</i>), pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>), smeđe pjegavosti lista (<i>Zymoseptoria tritici</i>), smeđe hrđe (<i>Puccinia triticina</i>), žute hrđe (<i>Puccinia striiformis</i>) i žuto smeđe pjegavosti (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	0,75 do 1,0 l/ha	kod pojave prvih simptoma, od sredine busanja do vidljivog 2. koljenca (BBCH 25–32) za suzbijanje uzročnika parazitskog polijeganja, odnosno do pune cvatnje (50 % prašnika zrelo) (BBCH 65) za suzbijanje ostalih uzročnika bolesti
ozimi i jari ječam	za suzbijanje uzročnika mrežaste pjegavosti (<i>Pyrenophora teres</i>), sive pjegavosti (<i>Rhynchosporium secalis</i>), pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>) i smeđe hrđe (<i>Puccinia hordei</i>)	0,75 do 1,0 l/ha	kod pojave prvih simptoma, od sredine busanja do početka klasanja (BBCH 25–49)
ozima raž	za suzbijanje sive pjegavosti (<i>Rhynchosporium secalis</i>) i pepelnice (<i>Blumeria graminis</i>)	0,75 do 1,0 l/ha	od sredine busanja do početka klasanja (BBCH 25–49).



Koje savjete slijediti prilikom primjene?

- Verben™ je proizvod izbora za rane aplikacije koje su kritične za kontrolu bolesti kao i za očuvanje

potencijala prinosa

- Djeluje i na nižim temperaturama
- Otporan je na ispiranje kišom – 30 mm kiše poslije 1 h od primjene

nema utjecaja na učinkovitost tretmana

- Maksimalni broj tretmana u toku vegetacije je jedanput

Posjetite nas na [Corteva.hr](https://www.corteva.hr)

™® Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava. © 2022 Corteva