

# StarterMn™ Platinum



**PFC 1(C)(I)(b)(i): PROSTY PŁYNNY  
NIEORGANICZNY NAWÓZ  
MAKROSKŁADNIKOWY**  
NAWÓZ MINERALNY N (SO<sub>3</sub>) 5(11,5) Z  
MIKROELEMENTAMI W ROZTWORZE

## Deklarowana zawartość:

|             |       |                                                                     |
|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 5,0 % wag.  | ..... | Azot całkowity (N)                                                  |
| 5,0 % wag.  | ..... | Azot mocznikowy (N)                                                 |
| 11,5 % wag. | ..... | Trójtlenek siarki rozpuszczalny w wodzie (SO <sub>3</sub> )         |
| 0,3 % wag.  | ..... | Bor rozpuszczalny w wodzie (B)                                      |
| 0,3 % wag.  | ..... | Miedź rozpuszczalna w wodzie (Cu) pochodząca z siarczanu miedzi     |
| 5,0 % wag.  | ..... | Mangan rozpuszczalny w wodzie (Mn) pochodząca z siarczanu manganu   |
| 0,05 % wag. | ..... | Molibden rozpuszczalny w wodzie (Mo) pochodzący z molibdenianu sodu |
| 3,0 % wag.  | ..... | Cynk rozpuszczalny w wodzie (Zn) pochodzący z siarczanu cynku       |

## Składniki:

Siarczan manganu<sup>1</sup> (CAS: 10034-96-5), mocznik<sup>1</sup> (CAS: 57-13-6), siarczan cynku<sup>1</sup> (CAS: 7446-19-7).

<sup>1</sup> Surowce pierwotne i mieszanina.

## Sposób działania:

**StarterMn Platinum** to płynny nawóz składający się z azotu, siarki i mikroelementów takich jak: mangan, bor, miedź, molibden i cynk. StarterMn Platinum sprzyja zbilansowanemu odżywianiu, przyczyniając się do zwiększania potencjału plonowania.

Dzięki technologii **Stoller Formulation Technology** zapewnione jest szybkie wchłanianie i przemieszczanie składników pokarmowych, które w naturalny sposób zapewniają roślinie optymalne odżywienie.

| INSTRUKCJA STOSOWANIA ORAZ DAWKOWANIE          |                                                       |                 |                          |       |                                                |                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------|---------------------------|
| Rodzaj upraw                                   |                                                       | Zabieg dolistny | Objętość cieczy roboczej | Dawka | Faza wzrostu                                   | Ilość zabiegów            |
| Rośliny Rolnicze                               | Pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto, owies, sorgo itd | ✓               | 150 – 200                | 2-3 l | Od krzewienia do liścia flagowego BBCH 21-39   | Zabiegi: 1–2 co 15–30 dni |
|                                                | Kukurydza                                             |                 |                          |       | Wzrost wegetatywny BBCH 14–18                  |                           |
|                                                | Słonecznik                                            |                 |                          |       |                                                |                           |
| Rośliny oleiste i bobowate (strączkowe)        | Soja, rzepak, groch, bobik                            | ✓               | 150 – 200                | 2 -3l | Wzrost wegetatywny i rozwój strąków BBCH 14-79 |                           |
| Warzywa o jadalnych owocach, warzywa bulwiaste |                                                       | ✓               | 200 - 400                | 2-3l  | Wzrost wegetatywny do kwitnienia BBCH 14-51    | Zabiegi: 2–3 co 15 dni    |
| Warzywa liściaste, cebulowe korzeniowe         |                                                       |                 |                          |       | Wzrost wegetatywny BBCH 14–42                  |                           |

|                   |                                                      |   |            |      |                                                                 |                             |
|-------------------|------------------------------------------------------|---|------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Trawy,<br>lucerna |                                                      | ✓ | 200 - 400  | 2-3I | Wzrost wegetatywny<br>BBCH 14-51                                | Zabiegi: 2–3 co 7–15<br>dni |
| Sady              | Drzewa<br>pestkowe,<br>ziarnkowe (jabłoni<br>grusza) | ✓ | 300 - 500  | 2-3I | Od fazy pęknięcia<br>pąków liściowych do<br>zawiązywania owoców |                             |
|                   | Orzech                                               | ✓ | 300 - 500  |      |                                                                 |                             |
| Szkółki<br>drzew  |                                                      | ✓ | 700–1000   | 2-3I |                                                                 |                             |
| Winorośl          | Winogrona<br>konsumpcyjne                            | ✓ | 300 - 1000 |      |                                                                 |                             |
|                   | Winogrona do<br>przetwórstwa                         |   | 500-1000   |      |                                                                 |                             |
| Owoce<br>jagodowe |                                                      | ✓ | 300 - 1000 | 2-3I |                                                                 |                             |
| Truskawka         |                                                      | ✓ | 300 - 1000 | 2-3I |                                                                 |                             |

W przypadku pytań lub aby uzyskać szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z firmą Corteva, jej dystrybutorem, lub doradcą technicznym.

#### **Instrukcje dotyczące stosowania:**

Możliwość sporządzania mieszanin: Produkt można mieszać z większością nawozów płynnych. Jeśli zaistnieje konieczność mieszania produktu z innymi nawozami, zalecany jest przeprowadzenie testu mieszalności. Użytkownik może zwiększać lub zmniejszać dawkę preparatu w zależności od rodzaju uprawy, lecz zawsze zgodnie z wytycznymi etykiety lub z zaleceniami doradcy. W każdym przypadku przed użyciem produktu zalecane jest przeprowadzenie próby na niewielkiej powierzchni rośliny uprawnej, w której produkt ma być zastosowany. W czasie zabiegu nigdy nie należy przekraczać dawek i stężeń podanych na etykiecie dla danej rośliny uprawnej.

#### **Sporządzanie cieczy roboczej:**

Podczas sporządzania cieczy roboczej należy użyć środków ochrony osobistej: rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

#### **Zalecane warunki przechowywania:**

Opakowania z produktem należy przechowywać w temperaturze od 0 do 35°C. Chronić przed światłem słonecznym, ciepłem i ekstremalnymi warunkami. Nie przechowywać razem z żywnością i paszą. Należy również zapoznać się z informacjami podanymi w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

#### **Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:**

**Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję na etykiecie.** Należy postępować zgodnie z instrukcją stosowania, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowisku.

Klasyfikację tego produktu przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).



#### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Siarczan manganu (H<sub>2</sub>O) (CAS: 10034-96-5)

Monohydrat siarczanu cynku (CAS: 7446-19-7)

Pięciowodny siarczan miedzi (CAS: 7758-99-8)

#### **KLASYFIKACJA PRODUKTU**

##### **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:**

**H411** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**H318** Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

**H373** Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

**Zwroty wskazujące środki ostrożności:**

- P260** Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.  
**P273** Unikać uwolnienia do środowiska.  
**P280** Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.  
**P305+P351+P338** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
**P310** Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.  
**P501** Zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze

**UFI: 3360-U09X-P00P-S5UK**

W razie nagłego wypadku skontaktować się z: + 48 601 66 2626

**Dodatkowe informacje:**

Do użytku profesjonalnego.

**OSTRZEŻENIE:**

Corteva Agriscience Poland udziela wszelkich zaleceń w oparciu o doświadczenia związane z produktem. W trakcie stosowania mogą wystąpić czynniki niekontrolowane (mieszaniny zbiornikowe, warunki pogodowe, sposób stosowania produktu itp.). W związku z tym odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody ponosi użytkownik.

|                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAN SKUPIENIA:</b> | Roztwór ciekły | <b>Producent:</b> STOLLER EUROPE, S.L.U.<br>A Stoller Group Company<br>Elche Parque Empresarial C/ Max Planck, 1.<br>03203 Elche, Alicante (Hiszpania) (+34) 965 110 522<br>info@stollereurope.com<br><a href="http://www.stollereurope.com">www.stollereurope.com</a><br><b>Dystrybutor:</b><br><br>Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o.<br>ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, tel.: +48 22 548 73 00,<br>email: <a href="mailto:biuro@corteva.com">biuro@corteva.com</a> ,<br><a href="http://www.corteva.pl">www.corteva.pl</a> |
| <b>MASA NETTO:</b>     | 6,7 kg e       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OBJĘTOŚĆ NETTO:</b> | 5 L e          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>NUMER PARTII:</b>   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |