

İMAL TARİHİ: Ambalajın Üzerine Bakınız.
SON KULLANMA TARİHİ: Ambalajın Üzerine Bakınız.
ŞARJ NUMARASI: Ambalajın Üzerine Bakınız.
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 07.07.2022 / 12398

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
Ayçiçek	Telkurtları (<i>Agriotes</i> spp.)	180 ml/ 1 ünite (150000 tohum) Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde
	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A.segetum</i>)	90 ml/ 1 ünite (150000 tohum) Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde
Mısır	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>A.segetum</i>)	30 ml/ 1 ünite (50000 tohum) Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde
	Telkurtları (<i>Agriotes</i> spp.)	60 ml/ 1 ünite (50000 tohum) Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde
Şekerpancarı	Telkurtları (<i>Agriotes</i> spp.)	4000 ml/100 kg tohum, Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde
Buğday	Ekin kamburböceği (<i>Zabrus</i> spp.)	40 ml/100 kg tohum Ekimden önce tohum ilaçlaması şeklinde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Yalnızca ticari tohum ilaçlamalarında standart, kalibre edilmiş tohum ilaçlama ekipmanları ile kullanınız. Bu ürün ekim sırasında veya ekimden hemen önce ilaçlama yapabilen tohum ilaçlama ekipmanları ile kullanılmaz. LUMIVIA, uygulanmadan önce ilaçlama ekipmanı temizlenmiş ve bir önceki ilaç artıklarından arındırılmış olmalıdır.

LUMIVIA, ambalajından aktarılmadan önce, ürünün homojen olmasını sağlamak için iyice karıştırılmalıdır. LUMIVIA doğrudan karıştırma tankına eklenir. İyi bir kaplama elde etmek için önerilen miktarda LUMIVIA'yı gerekli miktarda suyla karıştırınız.

KALİBRASYON:

Yalnızca ticari tohum ilaçlamalarında standart, kalibre edilmiş tohum ilaçlama ekipmanları ile kullanınız. İlaçlamadan önce ekipmanın uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz.

Ekim öncesi tohum ekim makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlı tohum kalibre edilmiş ekim makinaları ile rüzgarsız hava koşullarında tohumu uygun derinliğe ekilmelidir.

Buğday için: 100 kg buğday tohumu için kullanımı tavsiye edilen uygulama dozu 40 L su ile karıştırılıp tohumlara homojen bir şekilde pülverize edilerek uygulanmalıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı
T.C. GIDA, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



LUMIVIA®

Tohum ilaçlaması için akıcı konsantré (FS)

Grubu	28	İnsektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

625 g/l Chlorantraniliprole

Önce Etiket Okuyunuz.
Evde Kullanmayınız.
Çocuklardan, Gıda ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 gün İnsan ve Hayvan Sokmayınız.
İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. Bilinci kapalı kişiye ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.

Yutulması halinde: Tıbbi yardım alınız. Doktor veya zehirlenme merkezi tarafından söylenmediği sürece kusturmayınız. Kazazede bilinçli ise: Ağzı suyla çalkalayınız.
Gözle teması halinde: Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözü açık tutun ve 15-20 dakika boyunca yavaş ve nazikçe su ile yıkayınız. Gözde tahriş devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
Cilt ile temas etmesi halinde: Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Deriye bulaşmışsa, suyla iyice yıkayınız. Kirilenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Soluması halinde: Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur. Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

İÇİNDEKİLER: Chlorantraniliprole

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H332: Soluması halinde zararlıdır.
H410: Sulul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçınınız.
P271: Sadece dışarda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçindekileri/konteynerleri yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası yönetmeliklere uygun şekilde onaylanmış tesislerde bertaraf edin.
EUH208: Alerjik reaksiyona yol açabilir.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-LUMIVIA, mısır ve ayçiçek gibi bitkilerde toprak altı zararlılarına karşı geniş spektrumlu uzun rezidüel etkiye sahip başarıyla kullanılan bir insektisittir.
-Chlorantraniliprole, antranilik diamid grubu bir insektisit olup zararlıların ryanodin reseptörlerini aktive ederek etkiyi sağlar. Bunun sonucunda zararlıların kaslarının kasılmasını engelleyerek beslenmesini durdurur ve ölümüne neden olur. Normalde mide yoluyla zararlıyı kontrol etmekle beraber aynı zamanda kontak etki de görülür.
-Ürünü yalnızca kendi orijinal ve uygun etiketli ambalajında saklayınız.
-Ambalajları kuru, serin ve iyi havalandırılan yerde muhafaza ediniz.
-Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir, yer altı suları ve su kaynaklarına bulaştırmayınız.
-Yiyecek, içecek ve sudan uzak tutunuz.
-Yiyecek, içecek, su, gübre ve diğer bitki koruma ürünleri ile bulaştırmaktan kaçınınız. Su kaynaklarını kirletmeyin.
-Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız. Usulüne uygun şekilde imha ediniz.
-Ürünün kullanımından kaynaklanan atıkları yerinde veya uygun/lisanslı bir kimyasal atık tesisinde bertaraf ediniz.



CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.
YÜREĞİR V.D. - 311 000 0066
Tic. Sic. No: 29495

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

15 Ekim 2025

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra, sökülmesi zor olabilecek sertleşmiş tortuların oluşma riskini azaltmak için tüm karıştırma ekipmanlarını iyice temizleyiniz. Karıştırma ekipmanını boşaltınız, iyice durulayınız ve temiz suyla yıkayınız. İlgili tüm diğer uygulama ekipmanlarını temizleyiniz. Ekipmanı temizlerken gerekli tüm güvenlik önlemlerini alınız. Su kuyularının, diğer su kaynaklarının ve kültür bitkilerinin yakınlarında temizlemeyiniz. Atık durulama suyunu yerel düzenlemelere uygun olarak imha ediniz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısır, Ayçiçeği, Şekerpancarı ve Buğday: Sadece ticari tohum kaplama makinelerinde, standart ve kalibre edilmiş tohum kaplama ekipmanları ile kullanılmalıdır. LUMIVIA kullanımından önce kaplama makinesi temiz ve diğer bitki koruma ürünlerinden arındırılmış olmalıdır. Bitki koruma ürünü için karışımda gerekli olan su miktarı; tohum işleme makinesine, karışımda kullanılan diğer kimyevi maddelere ve kurutma işlemine bağlıdır. Bu sebeple kullanılan tohum kaplama makinesi ve diğer kullanılan kimyevi maddelerin talimatı dikkate alınarak uygulama yapılmalıdır. Her adımda bitki koruma ürününü tavsiye edildiği şekilde ve dozda kullanılmalıdır.

Ekim öncesi tohum ekim makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlı tohum kalibre edilmiş ekim makinaları ile rüzgarsız hava koşullarında tohuma uygun derinliğe ekilmelidir.

LUMIVIA hakkında bir şikayetiniz olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

LUMIVIA isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 28 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle olası direnç gelişimini geciktirmek için, LUMIVIA'nın aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. LUMIVIA ile işlenmiş tohumun ekimini takiben 60 gün boyunca chlorantraniliprole veya diğer Grup 28 bitki koruma ürünlerini uygulamayın.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

LUMIVIA, diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.



LUMIVIA®

Tohum ilaçlaması için akıcı konsantre (FS)

Grubu	28	Insektisit (Böcek İlacı)
-------	----	--------------------------

625 g/l chlorantraniliprole

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 (iki) yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Corteva, bu bitki koruma ürününün etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yeralmış kullanma gagesine uyacağını garanti eder. Bu bitki koruma ürününün kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar Corteva'nın kontrolü dışındadır. Bu ürün ile tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Corteva hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir.

CORTEVA BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

ÜRETİCİ FİRMA

Corteva Agriscience International Sarl
Route de Suisse 160, CH-1290
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

Corteva Agriscience LLC
2509 Rocky Ford Road, Valdosta, Georgia, 31601,
Amerika Birleşik Devletleri

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No: 910,
01375, Yüreğir, ADANA
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil Durum için: +90 538 973 22 00



CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
YÜREĞİR V.D. - 310 000 0066
Tic. Sicil No: 85819

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri



15 Ekim 2025
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR