



Pixxaro™ EC - tõhus lahendus probleemsete kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljades. Pixxaro™ EC sisaldab kahte toimeainet- uut toimeainet Arylex Active ja juba teada- tuntud Fluroksüüpüüri, mis tagavad hea efektiivsuse paljude kaheiduleheliste umbrohtude vastu, sealhulgas ALS inhibiitoritele resistentseid ligi (nt. resistente vesihein). Mõlemad herbitsiidid sisalduvad toimeained kuuluvad sünteetiliste auksiinide rühma (HRAC 4).

Pixxaro™ EC eelised:

- Pixxaro™ EC on herbitsiid, mis on kevadiseks kasutamiseks kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisis, taliodras, talirukkis, talitritikales, suvinisis ja suvioidras
- Paindlik kasutusaeg ja kulunorm (taliviljades BBCH 23-45, normiga 0,25 l/ha- 0,5 l/ha; suviviljades BBCH 13-45, normiga 0,125 l/ha- 0,35 l/ha). Kulunormi valikul lähtuda umbrohtude suurusest (suurem umbrohi vajab suuremat normi)
- Toimeaine imendub taime läbi lehtede, seepärast sobib kasutamiseks kõikidel mullatüüpidel ning puuduvad piirangud järelkultuuridele
- Võib segada enamike teiste taimekaitsevahenditega
- Ei vaja märgajat, kuna Pixxaro™ EC sisaldab pindaktiivseid aineid
- Vihmakindel juba 1 tund pärast pritsimist
- Kuna Pixxaro™ EC-s sisalduv toimeaine Arylex Active on väga kiiretoimeline, siis tundlikel umbrohuliikidel on visuaalsed sümptomid nähtavad juba päev pärast pritsimist
- Pixxaro™ EC tõrjub paljusid kaheidulehelisi umbrohtusid, nt roomav madar ehk virn, vesihein, kukemagun, valge hanemalts, harilik punand, verev iminõges ja kare kõrvik
- Tugevaim toode turul resistentse vesiheina tõrjeks



pritsimata



7 päeva pärast pritsimist



21 päeva pärast pritsimist

Pixxaro™ EC praktilised näpunäited:

- Pritsimiseks optimaalne temperatuur on vähemalt +10°C
- Ärge pritsige kui on olnud või kui on oodata öökülma
- Pixxaro™ EC efektiivsuse suurendamiseks vähemtundlike kaheiduleheliste umbrohtude vastu nt rukkilill, kesalill, mailaste ligi, põldkannike- kasutage paagisegus koos metüül-tribenurooni sisaldava herbitsiidiga nt. Trimmer 50 SG, Granstar Preemia 50 SX, jt
- Optimaalsed kulunormid:
 - taliviljad 0,33 l/ha Pixxaro™ EC + 20 g/ha Trimmer 50 SG (toimeaine metüültribenuroon);
 - suvinisu ja suvioider 0,25 l/ha Pixxaro™ EC + 15 g/ha Trimmer 50 SG (toimeaine metüültribenuroon)



Pixxaro™ EC efektiivsus maguna tõrjel



™ ® SM Ettevõtte Corteva Agriscience ja selle sidusettevõtete kauba- ja teenusemärgid. © 2024 Corteva

Turustaja:



KONTAKTID:

Corteva Agriscience



Priidu Adrijan
+372 58 55 74 73
Priidu.Adrijan@corteva.com



Diana Peedel
+372 51 911 939
Diana.Peedel@corteva.com



Kas soovite muuta oma uudiskirja tellimise seadeid?
Saate [muuta oma seadeid](#) või [sellest uudiskirjast loobuda](#).

Corteva · Gedimino Prospektas 44A · Naujamiescio K. · Vilnius 01110 · Lithuania

