



Queen[®]

Inatreq[™] Active

FUNGICIDE

GROUP

21 | 03

FUNGICIDE

FUNGICIDE VOOR GEBRUIK IN GRANEN

Aard van het preparaat: EC - Emulgeerbaar concentraat

Werkzame stof : fenpicoxamid (inatreq) + prothioconazool

Gehalte: 50 g/L + 100 g/L

Professioneel gebruik

Toelatingsnummer: 16560N



Toelatingshouder :

Corteva Agriscience Netherlands B.V.

Zuid-Oostsingel 24D, 4611 BB Bergen op Zoom

Tel : 0164 444 000 • Website : www.corteva.nl

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen).

Lotnummer : zie op de fles

[™] [®] Trademarks of
Corteva Agriscience
and its affiliated
companies.



296679

2508

5L e

WETTELIJK GEBRUIKSVORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2 CtgB juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintertarwe	Echte meeldauw ¹ , Gele bladvlekkenziekte ² , Kafjesbruin ³ , Fusarium ⁴ , Bruine roest ⁵ , Gele roest ⁶	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte ⁷	1,5 L/ha	
Winterrogge	Bladvlekkenziekte ² , Bruine roest ⁵ , Gele roest ⁶ , Echte meeldauw ¹ , Fusarium ⁴	2,0 L/ha	1
Triticale	Echte meeldauw ¹ , Gele bladvlekkenziekte ² , Kafjesbruin ³ , Fusarium ⁴ , Bruine roest ⁵ , Gele roest ⁶	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte ⁷	1,5 L/ha	
Spelt	Echte meeldauw ¹ , Gele bladvlekkenziekte ² , Kafjesbruin ³ , Fusarium ⁴ , Bruine roest ⁵ , Gele roest ⁶	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte ⁷	1,5 L/ha	

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Zomertarwe	Echte meeldauw ¹ , Gele bladvlekkenziekte ² , Kafjesbruin ³ , Fusarium ⁴ , Bruine roest ⁵ , Gele roest ⁶	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte ⁷	1,5 L/ha	
Zomerrogge	Bladvlekkenziekte ² , Bruine roest ⁵ , Gele roest ⁶ , Echte meeldauw ¹ , Fusarium ⁴	2,0 L/ha	1
Harde/durumtarwe	Echte meeldauw ¹ , Gele bladvlekkenziekte ² , Kafjesbruin ³ , Fusarium ⁴ , Bruine roest ⁵ , Gele roest ⁶	2,0 L/ha	1
	Bladvlekkenziekte ⁷	1,5 L/ha	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Echte meeldauw (*Erysiphe graminis* / *Blumeria graminis*)

² Gele bladvlekkenziekte (*Drechslera tritici-repentis* / *Pyrenophora tritici-repentis*)

³ Kafjesbruin (*Parastagonospora nodorum*)

⁴ Fusarium (*Fusarium graminearum*, *Fusarium culmorum*, *Fusarium avenaceum*)

⁵ Bruine roest (*Puccinia tritici*, *Puccinia recondita*)

⁶ Gele roest (*Puccinia striiformis*)

⁷ Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici* / *Septoria* spp.)

⁸ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

⁹ Fusarium (*Fusarium* spp.)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 150-300 liter water per ha.

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van:

- een techniek uit tenminste de klasse DRT95

Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en andere bestuivende insecten.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen fenpicoxamide (inatreg) en prothioconazool. Fenpicoxamide hoort tot de picolinamides. De FRAC code is C4. Prothioconazool behoort tot de Demethylation Inhibitors (DMI-fungiciden). De FRAC code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. Volg de aanbevelingen van de toelatingshouder op.

LEGE VERPAKKING

Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.



WERKINGSSPECTRUM

Bladvlekkenziekte (*Zymoseptoria tritici*/ *Septoria spp.*, *Rhynchosporium secalis*)
Bruine roest (*Puccinia triticina*/ *Puccinia recondita*)
Echte meeldauw (*Erysiphe graminis*/ *Blumeria graminis*)
Fusarium (*Fusarium graminearum*, *Fusarium culmorum*, *Fusarium avenaceum*, *Fusarium spp.*)
Gele roest (*Puccinia striiformis*)
Gele bladvlekkenziekte (*Drechslera tritici-repentis*/ *Pyrenophora tritici-repentis*)
Kafjesbruin (*Parastagonospora nodorum*)

GEBRUIKSAANWIJZING

Queen® moet preventief worden ingezet. Raadpleeg uw adviseur of de erkenningshouder voor tankmixen met herbiciden of groeiregulators.

Schudden voor gebruik.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich bij de erkenningshouder van de hoogte te stellen van de mogelijke mengbaarheid met de producten op basis van de op het etiket vermelde werkzame stoffen.

1 - WEERSOMSTANDIGHEDEN

Temperatuur dient te worden gemeten in de schaduw net vóór de bespuiting.
Niet spuiten bij noorden- of oostenwind. Bij warm weer, 's avonds spuiten



Einde behandeling

<= 30 minuten =>



regen

2 - RISICOBEPERKENDE MAATREGELEN

Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van zomergranen en wintergranen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

3 - REINIGING VAN HET SPUITTOESTEL

Het spuittoestel moet **onmiddellijk en grondig** schoongemaakt worden na gebruik van Queen®, dit om eventuele schade te vermijden op gevoelige gewassen die rond hetzelfde tijdstip met hetzelfde spuittoestel worden behandeld.

- Na gebruik moet alle spuitapparatuur zowel van binnen als van buiten grondig worden gereinigd met een tankreinigingsmiddel en water volgens het etiket of de aanwijzingen van de tankreiniger. Het spoelwater verspreiden over het behandelde gewas.
- Voorkom vervuiling van water tijdens de reinigingsprocedure.

Eventuele behandelingsoverschotten ca. 10 maal verdunnen en verspuiten op het al behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof vooral nauwkeurig worden berekend.

Raadpleeg de «Toolbox Emissiebeperking» op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

4 - OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

Dit product in een originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal daarvoor bestemd.

5 - EERSTE-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INSLIKKEN:

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

NA INADEMING:

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID:

Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij noodgevallen, contacteer SGS: **+32 3 575 0330** of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (alleen voor artsen)

AANSPRAKELIJKHEID

Verkoper garandeert dat de samenstelling van dit product overeenkomt met de chemische beschrijving, zoals vermeld op dit etiket. Er wordt geen andere garantie gegeven, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor welk doel dan ook. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gebrekkige prestaties, schade of letsel als gevolg van opslag, behandeling, toepassing, gebruik van dit product en weersomstandigheden, of het falen van dit product om resistente populaties onder controle te houden, aangezien dit buiten de controle van de verkoper ligt.

Copy

Queen®

Inatreq™ Active

FUNGICIDE**UFI: YW49-4089-R00M-MGQY**

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:

benzeensulfonzuur, 4-C10-14-alkyl derivaten, calciumzouten cyclohexanon reactiemengsel van N,N-dimethyldecaan-1-amide en N,N-dimethyloctaanamide

GEVARENAANDUIDINGEN

H315

Veroorzaakt huidirritatie.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H410

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

GEVAAR

GHS05



GHS09

VOORZORGSMAATREGELEN

P261

Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P280

Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming/...

P302+P352

BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.

P305+P351+P338+P310

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

SP1

Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

AANVULLENDE ETIKETELEMENTEN

EUH401

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.



296718

2508

5L e