

İmal Tarihi: Şarj Numarası: 12.12.2022 ve 12597
Son Kullanma Tarihi: Ruhsat Tarihi ve Numarası: 12.12.2022 ve 12597

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu
	Dar yapılacak yabancı otlar	
	<i>Alopecurus myosuroides</i> <i>Avena sterilis</i> <i>Bromus tectorum</i> <i>Paspalum dactyloides</i>	
	Geniş yapılacak yabancı otlar	
	<i>Antennaria arvensis</i> <i>Bifora radialis</i> <i>Cirsium arvense</i> <i>Deschampsia sophia</i> <i>Fimaria officinalis</i> <i>Gallium aparine</i> <i>Isatis tinctoria</i> <i>Lens culinaris</i> <i>Maritima chamomilla</i> <i>Papaver rhoeas</i> <i>Papaver</i> <i>Taraxacum officinale</i> <i>Veronica hederifolia</i> <i>Yucca sativa</i>	
Bugday	<i>Yapışkan ot</i> <i>Çivit otu</i> <i>Kendi gelen mercimek</i> <i>Papaya</i> <i>Tarla akcağıcağı</i> <i>Adi yavşan otu</i> <i>Yabancı fığ</i>	12 gr/da + 100 ml/da Surfer EH-9

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan miktarlarda REXADE 275 WG ve Surfer EH-9 ayrı bir kapta su ile iyice karıştırılır ve tam etimede sağlanır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çabır etimeden önce karışım depoya ilave edilir. Karışımın devam edilişinde depo suyla tamamlanır. Karışımın hazırlanması sırasında pH 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir. İlaçlama tamamlandıktan sonra karıştırma işlemine devam edilir. Uygulamalarda yapracağı bitizimle meme kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım ayrı gün içinde kullanılmamalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40lt olmalıdır.

KALIBRASYON

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur, belirli su miktarı ile ne kadar alının istendiği belirlenir ve uygulamada kullanılacak su ve herbisit miktarı hesaplanır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, sürtüklemeyi önlemek için rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİ

REXADE 275 WG, bugday tarımında sorun olan dar ve geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek amacıyla çıkış sonrası, aynı pakete içinde birlikte verilen **Surfer EH-9** adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılır.

REXADE 275 WG, toprak rutubetinin yeterli olduğu, dar ve geniş yapraklı yabancı otları çıkışlarını tamamladığı, istatirinin bugday birtisi tarafından henüz kapatılmamış olduğu, genç ve aktif büyüme döneminde (dar yapraklı türlerin kardeşleme öncesi, geniş yapraklı türlerin 2-6 gerçek yapraklı oldukları dönem) uygulanır. İlaçın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yeter alıcı ile uygulandığında en iyi etki dekara 20-40 litre su kullanıldığı zaman alınır. Yabancı otları kıran çıkışta gösterdikleri durumdan dönem atlatılmadan, yani ilkbaharda gelişme yeniden başlandıktan önce kullanılmamalıdır. Bugday birtisinin kardeşleme döneminin ortasında sonuna kadar uygulanabilir. Bugday birtisini sapa kalktıktan sonraki geç dönemlerinde kullanılmamalıdır. Ortalama hava sıcaklığının 5°C'in altında olduğu, hava tahminlenince göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

REXADE 275 WG hakkında bir şikayeciniz olması halinde İl/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildiriniz.



REXADE® 275 WG

Suda Dağılıblan Granül (WG)

Grubu	O	B	Herbist (Yabancı ot ilacı)
-------	---	---	----------------------------

% 18.75 Pyroxulam + % 5.21 (%5.0 gae/kg) Halauxifen-methyl + % 3.75 Florasulam + % 26.6 cloquintocet-asit (salfener)

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EYDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRAŞINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİĞARA KULLANMAYINIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELERİ İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKLİDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz.

Yutulması halinde: Tıbbi acil durum tedavisi şart değildir.

Gözler ile temas etmesi halinde: Gözleri bol suyla birkaç dakika yıkayın. 1-2 dakika sonra konik lensleri çıkarın ve birkaç dakika daha yıkamaya devam edin. Etki görülürse, terchen göz uzmanı bir doktora başvurun.

Cilt ile temas etmesi halinde: Kontamine giysileri çıkarın. Hemen cildinizi bol miktarda su kullanarak yıkayınız.

Soluması halinde: Hissiyi temiz havaya çıkarın. Doktora danışın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

*114 Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Temmuz 2025

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Net miktarı :
Azami perkenecle satış fiyatı:

İçindekiler: Halauxifen-methyl, Florasulam, Pyroxulam



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P280: Koryunyu eldiven/koryunyu kuyafet/göz koryunyu/yüz koryunyu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel tüzüğe uygun olarak bertaraf edin.

EU401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

EUH208 : İçerik: Pyroxulam. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Sistemik etkili geniş spektrumlu, hem dar hem geniş yapraklı yabancı ot ilacıdır.
- REXADE 275 WG farklı etki mekanizmalarına sahip sistemik etkili halauxifen-methyl (Arylex™ active), florasulam ve pyroxulam aktif maddelerini içerir.
- Yapraklar, sürgünler, kışın da kökler tarafından alınarak büyüme noktalarna taşınan etkili maddeler. REXADE 275 WG uygulandıktan hemen sonra, yabancı otların büyümesini durdurur. Hassas türlerde ölüm birkaç haftaya bulur da, bitki koruma ürününün etkileri yabancı otları özellikle büyüme döneminde olan dokularda uygulamadan hemen sonra gözlenmeye başlar.
- REXADE 275 WG aynı pakete birlikte sunulan Surfer™ EH-9 adlı yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmamalıdır.

- İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.
- Tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında tavsiye edilen birtiklere yan etkisi yoktur.
- Her türlü yer alıcı ile uygulanır. Herbisitler için ayrı uygulama alıcı ve ekipmanı ile yapracağı bitizimle memeler kullanılmamalı, uygulamaya alıcı 3 m'ten daha değişik basıncıla çalıştırılmamalıdır. Rüzgarlı havalarda ve yüksek basıncı alıcılarla uygulama yapılması tavsiye edilmemektedir.
- Kilitli birtisi ve yabancı otları kuraklık devam eden gece donları, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi nedenlerle stres altında bulunduğunda kullandığı uygulamaya uygulanmamalı, stres koşulları ortadan kalkmaya kadar beklemelidir.
- Uygulama sonrasındaki sıcak ve nemli şartlar bitki koruma ürününün etkisini artırıp hızlandırmak, kurak şartlar etkisi geciktirebilir.
- İlaçlamadan 1 saat sonra yağın yağın bir bitki koruma ürününün etkisini azaltmaz.
- Kurak geçen yıllarda daha iyi sonuç almak için, uygulamadan önce veya 2 saat sonra yağmurlama sulama yapılması tavsiye edilir.
- Tarla bitiminde döngü yaparken ist ist ilaçlama yapmaktan kaçınınız.
- Tüm tarımsal uygulamalarda vücutta koryunyu, gerekli tedbirler alınmalı; lastik eldiven, gözlük ve vücutta koruyan bir elbise giymelidir.
- Arıların zehirlenir. Çiçeklenme zamanı kullanılmamalıdır.
- Bağcılara zehirlenir. Yer alıcı ve yer üstü su kaynaklarına bulgınamayınız.
- Boş kapları başka maksatlar için kullanılmayınız. Boşalan ambalajları yasalarca onaylanan tavsiyelerle uygun olarak imha ediniz. (Önemli ifadeler: P501)

CORTEVA
agriscience

CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.

YÜREĞİR V.D. 310 000 0066

Tic. Sicil No 285615

Hisseğin BÜYÜK

Ruhsatlandırma Lideri

Devamı Sayfa 2'de...

Sayfa 1'in devamı

DİRENÇ YÖNETİMİ

REXADE 275 WG adı btki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O, B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip btki koruma ürünlerinin tekrarlıyan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmemektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için REXADE 275 WG'ın aynı üretim sezonu içerisinde öncülerle uygulama sayısını aşmıyoruz. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O, B harici) btki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİLEBİLİRLİK DURUMU

Diğer btki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ

Herbisitlerin toprakta bozulması mikrobiyal aktiviteye bağlıdır ve toprak organik madde içeriği, toprak kolloidleri, toprak nemli ve toprak pH'ı gibi faktörlerden etkilenir. Herbisitlerin uygulamalarını takip eden toplanmış yağış miktarı da bozulmayı etkileyen bir faktördür. Mercimek ekiminden önce toprak 30-35 cm derinliğe işlenmeli ve herbisit uygulaması ile ekim tarihi arasındaki süre en az 12 ay olmalıdır.



REXADE® 275 WG

Suda Dağılabilen Granül (WG)


Grubu	O	B	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	---	---	--------------------------------

% 18.75 Pyroxulam + % 5.21 (%5.0 gae/kg) Halauxifen-methyl
+ % 3.75 Florasulam + % 26.6 cloquintocet-asit (safener)

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere bağlı olarak doktor değerlendirmesine göre tedavi edilir.

ZEHİRELENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (ÜZEM)'NİN 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ.

TM Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.



Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında iki (2) yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bu btki koruma ürününün belirtilen kimyasal bileşimine uygun olarak imal edildiğini ve etikete belirtilen şartlar dahilinde kullanılması halinde, yazılı tavsiyelere uyguladığını garanti eder. Btki koruma ürününün yanlış tabükatından, zamanında kullanılmamasından; etiket tavsiyeleri dışında kullanılmasından ve/veya yanlış depolanmasından dolayı meydana gelebilecek zarar, ziyan ve tüm sorumluluk kullanıya aittir.

ÜRETİCİ FİRMA

Corteva Agriscience International Srl
Route de Suisse 160, CH-1290,
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ

Torre S.R.L.
Via Pian d'Asso 53024, Torrenova, Siena (SI) / İtalya

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

Corteva Türkiye Tarım A.Ş.
Taşçı Mahallesi, Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir/Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

09 Temmuz 2025

[Signature]