

İmal Tarihi : Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası : Ruhsat Tarihi ve Numarası : 02.11.2021 / 12107

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Septoria yaprak lekesi (Septoria tritici)	100 ml/da	42 gün
	Tahıl küllenmesi (Erysiphe graminis)	75 ml/da	
	Sarı pas (Puccinia striiformis)	75 ml/da	
	Buğdayda başak yanıklığı (Fusarium culmorum, Fusarium graminearum)	100 ml/da	
	Fide yanıklığı, kök ve kök boğazi çürüklüğü (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Bipolaris sorokiniana)	100 ml/da	
Arpa	Arpa yaprak yanıklığı (Rhynchosporium secalis)	100 ml/da	42 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilacı aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlanacak şekilde ilacı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposuna güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıya ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

CORTEVA
agriscience
VERBEN
Emülsiyeli Olabilen Konsantre (EC)

Grup	3	13	Fungisit (Mantar İlacı)
------	---	----	-------------------------

200 g/l prothioconazole + 50 g/l proquinazid

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulaması esnasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız
Bitki koruma ürününü uygulandıktan 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR
Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarını içine 3/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İnsan zehirlenme vakaları bilinmemekte ve deneyimsiz zehirlenme semptomları bilinmemektedir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalajı veya etiketini birlikte götürünüz. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermayınız.

Yutulması halinde: Tıbbi bakım alınız. Doktor veya toksite merkezi tarafından

söylenmediği sürece KUSTURMAYINIZ. Kazazede bilinci ise: Ağzı suyla çalkalayınız.

Soluması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerektirebilir.

Deriyle teması durumunda: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahrişi olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

Gözle teması halinde: Kontakt lens varsa ve çıkarılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114

NUMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

KULLANIMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ

TM* Corteva Agriscience ve bağlı ortaklığının ticari markasıdır.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı. ZNE

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

03 Ocak 2023

CORTEVA
agriscience
CORTEVA TÜRKİYE TARIM A.Ş.
YÜREĞİR V.D. - 310 000 0066

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

İmza No: 8515

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:
İÇİNDEKİLER: prothioconazole, proquinazid
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H410 Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNEMLİ İFADELERİ:

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P261 Sisi/buharları/spreyi solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşime halinde ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P501 İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ürün yalnızca kendi orijinal ve uygun etiketli ambalajında saklayınız.
- Ambalajları kuru, serin ve iyi havalandırılan yerde muhafaza ediniz.
- Çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayınız.
- Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 (iki) yıl süre ile VERBEN'in fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Corteva bu bitki koruma ürününün etiketindeki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanıma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacakları garanti eder. Bu bitki koruma ürününün kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesisizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen uygulamalardan meydana gelebilir ki bunlar Corteva'nın kontrolü dışındadır. Bu ürün ile tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal uygulama koşulları dışındaki şartlarda yapılan uygulamalar neticesinde meydana gelebilecek zararları Corteva hiçbir şekilde mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. CORTEVA BU BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BASKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA SEKİ:

Buğdayda septorya yaprak lekesi hastalığına karşı uygulama için genel olarak en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru turmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağın çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde , tarla bulasık ve başaklanma döneminde yağışlı havalarda devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir. Uygulamanın tekrarlanmasının gerektiği durumlarda, ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

Buğdayda tahıl küllemesi; hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların, özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır.

Buğdayda sarı pas hastalığının erken dönemde alt yapraklardaki belirtileri her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak (%90 oranında nem ve 15-20 °C sıcaklık) hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam ilaçlamasına başlanmalıdır. İklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa, son uygulama ile hasat arasındaki süre dikkate alınarak ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

Buğdayda başak yanıklığı hastalığına karşı buğday bitkilerinin çiçeklenme devresi ortasında bir uygulama yapılır.

Buğdayda fide yanıklığı, kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına karşı yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Gerekli hallerde ikinci ve üçüncü uygulamalar ön görülen aralıklarla yapılmalıdır.

Arpada arpa yaprak yanıklığı hastalığının belirtileri ilk görüldüğünde uygulamaya başlanır ve koşullar hastalığın gelişimi için uygun olarak seyrederse ilk ilaçlamadan 21 gün sonra uygulama tekrarlanabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

VERBEN etki mekanizmasına göre Grup 3 ve 13 olarak sınıflandırılmış bir fungisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, olası direnç gelişimini geciktirmek için VERBEN'in aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 ve 13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞILABİLİRLİK DURUMU:

VERBEN'in diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması önerilmez.



Emülsiyon Olabilen Konsantre (EC)

Grup	3	13	Fungisit (Mantar İlacı)
------	---	----	-------------------------

200 g/l prothioconazole + 50 g/l proquinazid

ZEHİRLENME DURUMUNDA, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN: 114 NÜMARALI TELEFONUNU ARAYINIZ

KULLANMADAN ÖNCE YİCE ÇALKALAYINIZ

TM* Corteva Agriscience ve bağlı ortaklıklarının ticari markasıdır.

ÜRETİCİ FİRMA:
Corteva Agriscience International Sàrl
Route de Suisse 160 CH-1290
Versoix, İsviçre

ÜRETİM TESİSİ:
Corteva Agriscience France S.A.S.
82, Rue de Wittelsheim BP-90149
68701 Cernay Cedex, Fransa

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Corteva Turkey Tarım A.Ş.
Taşçı Mah. Karataş Bulvarı No:910
Yüreğir, Adana, Türkiye
Tel: +90 322 355 68 00
Faks: +90 322 503 33 27

Acil durum telefonu: +90 538 973 22 00



CORTEVA TURKEY TARIM A.Ş.
YÜREĞİR MAH. - 010 000 0066
Tic. Sic. No: 2785615

Hüseyin BÜYÜK
Ruhsatlandırma Lideri

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KONTROL EDİLMİŞTİR

13 Ocak 2023