

# Verpixo<sup>®</sup> SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

#### COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

##### Ingredientes Activos (IUPAC):

Florylpicoxamid: 1S)-2,2-bis(4-fluorophenyl)-1-methylethyl N-([3-(acetyloxy)-4-methoxy-2-pyridyl]carbonyl)-L-alaninate .....

Ingredientes Aditivos e Inertes: .....C.S.p.

100 g/l  
1 litro

REGISTRO NACIONAL ICA N°: PL0005242024

Titular del registro: Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

#### FORMULADO POR:

Corteva Agriscience LLC

9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268,  
USA



#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Corteva Agriscience de Colombia S.A.S.

Calle 113 No. 7-21 Torre A, Oficina 1401

Tel: (601) 259 5900

Bogotá D.C. - Colombia

Nocivo en caso de ingestión  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para  
organismos  
acuáticos

<sup>TM</sup> Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva



# PELIGRO

# Verpixo<sup>®</sup> SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

**MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:** Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active) es un fungicida que previene la germinación de las esporas en las superficies de las hojas y detiene el crecimiento micelial fúngico y el desarrollo fructífero del hongo. Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active) hace parte de grupo químico de las picolinamidas establecido por primera vez por Corteva. Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active) actúa a nivel de la respiración celular en el complejo III, inhibiendo la ubiqui-nona reductasa en la parte interna de la membrana (Qil), y por ende la transferencia de electrones y reducción de moléculas de ATP.

Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active) es un fungicida que tiene un sitio de acción (Qil) novedoso. Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active) actúa en un sitio diferente al que actúan las Carboxamidas (SDHI) y las Estrobirulinas (Qol) y no presenta resistencia cruzada con otros mecanismos de acción para patógenos ascomicetos. Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active) ofrece una solución de amplio espectro de patógenos ascomicetos.

**MODO DE EMPLEO:** Verpixo SC (Adavelt Active) puede ser utilizado con cualquier equipo de aplicación terrestre siempre y cuando se asegure la dosis por hectárea. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Deberá de utilizar el equipo de protección antes de usar Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active), calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando la dosis correcta. Verpixo<sup>®</sup> SC (Adavelt Active) debe ser aplicado con boquillas para fungicidas de cono hueco o sólido. Después de la aplicación lave, el equipo de protección personal y el equipo de aplicación, báñese bien con agua y jabón, póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.

| CULTIVO      | ENFERMEDAD                                   | DOSIS<br>(L/ha O cc/Litro de agua)                                              | L.M.R<br>(mg/kg) | P.C.<br>(días) | P.C.<br>(horas) |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Ornamentales | Moho gris<br><i>Botrytis cinerea</i>         | 2.0 L/ha o 2.0cc/Litro de agua en 1000 L de mezcla/ha.                          | N.A.             | N.A.           | 4               |
| Rosa         | Mildeo<br><i>Polvoso Podosphaera pannosa</i> | 1.5 L/ha a 2.0 L/ha o 1.3cc/L de agua a 1.7cc/L de agua en 1200 L de mezcla/ha. | N.A.             | N.A.           | 4               |

**Período de Carencia (PC):** Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

**Periodo de re-entrada (PR):** Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área tratada. Las personas podrán ingresar antes de este período utilizando el equipo de protección personal requerido para la aplicación.



# Verpixo<sup>®</sup> SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

**Rosa:** Utilizar la dosis más baja del rango para situaciones de menor presión de la enfermedad y utilizar la dosis más alta del rango para situaciones de mayor presión de la enfermedad, siguiendo la guía para el manejo de resistencia de **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active).

#### MANEJO DE RESISTENCIA Y PREVENCIÓN

Guía para el manejo de resistencia de **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) aplicado foliarmente: Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fúngicas. **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) contiene el ingrediente activo Florylpicoxamid (GRUPO FRAC 21). **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) debe integrarse en un programa de rotación con otros mecanismos de acción que proporcionen un control eficaz de la enfermedad objetivo.

En Ornamentales realizar máximo 5 aplicaciones al año de **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) (Picolinamidas) en alternancia. Aplique **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) (Picolinamidas) en rotación con otros mecanismos de acción que no tengan resistencia cruzada. **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) debe usarse en condiciones Preventivas para controlar el riesgo de resistencia.

Use el fungicida **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) como parte de una estrategia de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) que incorpore otros métodos de control. Siga siempre las recomendaciones específicas de la etiqueta con respecto a las dosis y a la guía del producto para el manejo de la resistencia.

#### COMPATIBILIDAD

Antes de utilizar mezclas, es necesario realizar una prueba de premezcla con las dosis equivalentes a las especificadas en la etiqueta de los productos y observar los posibles cambios adversos que se puedan presentar en el tanque de mezcla (precipitación, floculación, etc.). Evite mezclar varios materiales al mismo tiempo y evite mezclas de aspersión muy concentradas.

#### FITOTOXICIDAD

Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no se ha observado fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados. Antes de realizar la aplicación, se recomienda aplicar el producto en un área pequeña, 7 días antes, para confirmar la selectividad sobre las diferentes variedades.

#### INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

**“El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.**

**CATEGORÍA 4  
LIGERAMENTE PELIGROSO**



# Verpixo<sup>®</sup> SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- “Este producto puede ser mortal si se ingiere”
- “No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Durante la manipulación y aplicación, y para ingresar al área tratada de acuerdo al periodo de reentrada, use camisa de manga larga, pantalón largo, calcetines, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.”
- “Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre cultivos susceptibles.”
- “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL, ETIQUETADO Y CERRADO, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN.”
- “EL USO INADECUADO DE EL PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE.”
- “NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN.”
- “NO ALMACENAR NI TRANSPORTAR JUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS NI FORRAJES.”
- NO DEBE TRANSPORTARSE CON PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO O ANIMAL.
- CONSERVAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE ORIGINAL ETIQUETADO Y CERRADO.
- NO REENVASAR O DEPOSITAR EL CONTENIDO EN OTROS ENVASES.
- MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR Y LAS CHISPAS.
- ALMACENAR EN UN LUGAR SECO.

#### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

**Grupo químico:** Picolinamida

- **En caso de ingestión:** EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUZCA EL VÓMITO ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MAS CERCANA. Inmediatamente, llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia.
- **En caso de contacto con los ojos:** mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Busque atención médica de manera inmediata.
- **En caso de contacto con la piel:** retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.
- **En caso de inhalación:** Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

**Instrucciones para Tratamiento Médico:** No existe un antídoto específico. Su tratamiento es sintomático.



# Verpixo<sup>®</sup> SC

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### Suspensión Concentrada (SC)

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE EL PACIENTE AL HOSPITAL MÁS CERCANO Y MUESTRE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA.



Para emergencias químicas e intoxicaciones llamar a CISPROQUIM<sup>®</sup> SERVICIO LAS 24 HORAS.  
TELÉFONOS: 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.  
En Bogotá comunicarse con el (601) 2886012 - 9191919

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Extremadamente tóxico para peces y organismos acuáticos.
- Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.
- En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin.
- No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos, hágalo en la forma específicamente recomendada.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.
- No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Para la aplicación de **Verpixo<sup>®</sup> SC** (Adavelt Active) se debe establecer una franja de seguridad de mínima de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección

**“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMOS.”**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS”**

**“NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE REUTILIZARSE. DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO. ENTREGUE O DEPOSITE EL ENVASE EN EL LUGAR DE DESTINO DISPUESTO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, PARA SU GESTIÓN.”**

Fecha de Aprobación ICA: 18/02/2025

