

Verpixo®

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Florylpicoxamid	100 g/l
Excipientes	c.s.p. 1l

Registro Nacional N°: 344-F1/NA

Titular del Registro: CORTEVA AGRISCIENCE DE ECUADOR S.A.
Av. 6 de diciembre 2816 y Paúl Rivet. Edificio Josueth Gonzáles.
Oficina 10. Quito, Ecuador

FORMULADO POR:



CORTEVA AGRISCIENCE LLC
9330 Zionsville Road - Indianapolis,
IN 46268, Estados Unidos

DISTRIBUIDO POR:

Interoc
Km. 16.5 Vía Daule.
Teléfono 593 4 822 4662
Guayaquil - Ecuador

GRUPO 21 FUNGICIDA

Nocivo en caso de ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Tóxico para
organismos
acuáticos

™ Marcas registradas de Cortevea Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Cortevea.



ATENCIÓN

Rev.agosto/2025

Verpixo®

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN:

Verpixo® es un fungicida que previene la germinación de las esporas en las superficies de las hojas y detiene el crecimiento micelial fúngico y el desarrollo fructífero del hongo. **Verpixo®** hace parte de grupo químico de las picolinamidas establecido por primera vez por Corteva.

Verpixo® actúa a nivel de la respiración celular en el complejo III, inhibiendo la ubiqui-nona reductasa en la parte interna de la membrana (Qil), y por ende la transferencia de electrones y reducción de moléculas de ATP.

Verpixo® es un fungicida que tiene un sitio de acción (Qil) novedoso. **Verpixo®** actúa en un sitio diferente al que actúan las Carboxamidas (SDHI) y las Estrobirulinas (QoI) y no presenta resistencia cruzada con otros mecanismos de acción para patógenos ascomicetos. **Verpixo®** ofrece una solución de amplio espectro de patógenos ascomicetos.

MODO DE EMPLEO: **Verpixo®** puede ser utilizado con cualquier equipo de aplicación terrestre siempre y cuando se asegure la dosis por hectárea. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento.

Deberá de utilizar el equipo de protección antes de usar **Verpixo®**, calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando la dosis correcta. **Verpixo®** debe ser aplicado con boquillas para fungicidas de cono hueco o sólido. Después de la aplicación, lave el equipo de protección personal y el equipo de aplicación, báñese bien con agua y jabón, póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.

“CONSULTE CON UN AGRÓNOMO O UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C.
ROSA (<i>Rosa</i> sp.)	Botritis, (<i>Botrytis cinerea</i>)	2.0 l/ha	N.A.
	Oidio (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	1.5 l/ha	N.A.

P.C: Período de carencia

VOLUMEN DE AGUA:

Para Botritis (*Botrytis cinerea*) se recomienda 2.0 cc/litro de agua de **Verpixo®** con un volumen de mezcla de 1000 L/ha.

Para Oidio (*Sphaerotheca pannosa*) se recomienda 1.0 cc/litro de agua de **Verpixo®** con un volumen de mezcla de 1500 L/ha.



Verpixo®

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para Botrytis: Realizar la aplicación en principios de floración. Realizar la siguiente aplicación 7 días después de la primera. Se recomienda rotar el producto con fungicidas de diferente grupo químico para el manejo de la resistencia.

Para Oídio: Realizar la aplicación con la aparición de los primeros síntomas (menos del 3% de severidad). Realizar la siguiente aplicación 7 días después de la primera. Se recomienda rotar el producto con fungicidas de diferente grupo químico para el manejo de la resistencia.

MANEJO DE RESISTENCIA

Guía para el manejo de resistencia de **Verpixo®** aplicado foliarmente: Se alienta el manejo responsable de la resistencia para garantizar un control efectivo a largo plazo de las enfermedades fúngicas. **Verpixo®** contiene el ingrediente activo Florylpicoxamid (CÓDIGO FRAC 21). **Verpixo®** debe integrarse en un programa de rotación con otros mecanismos de acción que proporcionen un control eficaz de la enfermedad objetivo. En rosa, realizar máximo 5 aplicaciones al año de **Verpixo®** (Picolinamidas) en alternancia.

Aplique **Verpixo®** (Picolinamidas) en rotación con otros mecanismos de acción que no tengan resistencia cruzada. **Verpixo®** debe usarse en condiciones preventivas para controlar el riesgo de resistencia. Use el fungicida **Verpixo®** como parte de una estrategia de Manejo Integrado de Cultivos (MIC) que incorpore otros métodos de control. Siga siempre las recomendaciones específicas de la etiqueta con respecto a las dosis y a la guía del producto para el manejo de la resistencia.

PERÍODO DE RE-ENTRADA: 4 horas.

COMPATIBILIDAD

Antes de utilizar mezclas, es necesario realizar una prueba de premezcla con las dosis equivalentes a las especificadas en la etiqueta de los productos y observar los posibles cambios adversos que se puedan presentar en el tanque de mezcla (precipitación, floculación, etc.). Evite mezclar varios materiales al mismo tiempo y evite mezclas de aspersion muy concentradas.

FITOTOXICIDAD

Usado en las dosis recomendadas y siguiendo las indicaciones de esta etiqueta, no se ha observado fitotoxicidad en los cultivos aquí recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere más información, comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.

CATEGORÍA 4 – LIGERAMENTE PELIGROSO



Verpixo®

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo en caso de Ingestión. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo si se Inhala. Evitar que el producto entre en contacto con piel, ojos y ropa.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Picolinamida.

En caso de inhalación: Conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de ingestión, “NO INDUZCA EL VÓMITO, NI ADMINISTRE NADA POR VÍA ORAL”.

Contacto con la piel: Retírese la ropa contaminada, “lavarle con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos”.

Contacto con los ojos: “lavarlos con abundante agua fresca durante 15-20 minutos”, si hay lentes de contacto, quitarlos después de los primeros 5 minutos y continuar lavando los ojos.

En caso de inconsciencia, no suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente, CONSULTAR CON UN MÉDICO.

Tratamiento: Sintomático.

Síntomas: Puede causar irritación a la piel en caso de contacto o reacciones alérgicas.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

RELATIVAS A LA SEGURIDAD: “Este producto puede ser mortal si se ingiere”. No comer, beber o fumar durante la mezcla, aplicación y manipulación. Use camisa, manga larga, pantalón largo, botas, visor, tapabocas o máscara y guantes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada de forma separada y báñese con abundante agua y jabón. “ALMACENAR EL PRODUCTO EN EL ENVASE CON ETIQUETA Y TAPA ORIGINAL, ALEJADO DE ALIMENTOS Y MEDICINAS PARA USO HUMANO Y VETERINARIO, BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN”. “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE”. “NO ALMACENAR DENTRO DEL DOMICILIO”. “NO ALMACENAR, NI TRANSPORTAR JUNTAMENTE CON ALIMENTOS, MEDICINAS, BEBIDAS, NI FORRAJES”.



Verpixo®

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS: “En caso de intoxicación, ACUDA INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD DE SALUD MÁS CERCANA y muestre la etiqueta y la hoja Informativa adjunta, cuando corresponda”.



EN CASO DE EMERGENCIA, LLAME AL: ECU 911 o al CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO CIATOX 1800 VENENO (836366), atención ININTERRUMPIDA las 24 horas. CORTEVA AGRISCIENCE DE ECUADOR S.A. Tel. 02-250-8751. Ext.114

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS: Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe re-utilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final o deposite los residuos en los sitios destinados por las Autoridades para este fin.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. Extremadamente tóxico para peces y organismos acuáticos invertebrados. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación, lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la aplicación de Verpixo® se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensitivas tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente.

