

Zoral™

Arylex™ active

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
OGRÄSMEDEL**

UFI: 54VE-508X-D00H-W2VM



(FI)

Vaara

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta.

Epäillään vaurioittavan sikiötä.

Erittäin myrkyllistä vesieläimille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Käytä suojakäsineitä/suojavaateita/silmiensuojainta/kasvosuojainta.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin
Ei saa oksennuttaa.

Valumat on kerättävä.

Varastoi lukitussa tilassa.

(SE)

Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarig ögonirritation.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Missläkns kunna skada det ofödda barnet.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Framkalla INTE kräkning.

Samla upp spill.

Förvaras inlåst

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)**

284435 2603 - FINLAND

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 5 L

Zoral™

Arylex™ active

3 362130 208983 >

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
OGRÄSMEDEL****GROUP 1 (A) HERBICIDE****GROUP 4 (D) HERBICIDE****GROUP 2 (B) HERBICIDE**

UFI: 54VE-508X-D00H-W2VM

Käyttötarkoitus: Syysviljoilla (syysvehnä, syysohra, ruis, speltti ja ruisvehnä) ja kevätilviljoilla (kevätevehnä ja -ohra) hukkakauran ja rikkakananhirsin torjuntaan.

Användningsändamål: För bekämpning av flyghavre, hönshirs och kavelhirs i höstsäd (höstvetete, höstkorn, råg, spelt och rågvete) och vårsäd (vårsvete och vårkorn).

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Käyttäjärhymä: Ammattikäyttäjät
Tehoaineet:

Pinoksadeeni 45 g/l, 4,7 % (w/w)
Halaufsifeeni-metyyli 4,82 g/l, 0,52 % (w/w)
Florasulaami 3,85 g/l, 0,4 % (w/w)

Suoja-aine:
Klokintosetti-meksyyli 11,25 g/l, 1,17 % (w/w)
Valmistetyyppi: EC

Användargrupp: Yrkesanvändare
Verksamma ämnen:

Pinoksadeeni 45 g/l, 4,7 % (w/w)
Halaufsifeeni-metyyli 4,82 g/l, 0,52 % (w/w)
Florasulaami 3,85 g/l, 0,4 % (w/w)

Skyddsämne:
Klokintosetti-meksyyli 11,25 g/l, 1,17 % (w/w)
Preparattyp: EC

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Valmistaja ja pakkaaja: Corteva Agriscience
Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY,
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Tillverkare och förpackare: Corteva Agriscience
Representant i Finland: Corteva Agriscience Finland OY,
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Luvanhaltija: Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H, DK-14111 Köpenhamina K, Tanska.
Puh. +45 45 28 08 00

Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S,
Langebrogade 3H, DK-14111 Köpenhamn K, Danmark.
Tfn. +45 45 28 08 00

Rekisterinumero: 4106**Registreringsnummer: 4106**

Poikkeuslupa kasvinuoujelen hätätilanteessa 1.5.2026-28.8.2026.

Dispens i nödsituationer på växtskyddsområdet 1.5.2026-28.8.2026

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

284436 2603

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)**

**NETTOTILAVUUS/
NETTOVOLYM: 5 L**

Käyttöohjeet:**Ruiskutusolosuhteet:**

Zoral on orastumisen jälkeen syysviljoilla (syysvehnä, syysohra, ruis, speltti ja ruisvehnä) ja kevätilviljoilla (kevävehnä ja -ohra) käytettävä rikkakasvien torjunta-aine hukkakauran, rikkakananhirssin ja viherpantaheinän torjuntaan.

Zoral vaikuttaa rikkakasveihin lehtien kautta. Zoralille herkillä rikkakasveilla teho alkaa näkyä muutaman päivän tai viikon kuluttua ruiskutuksesta, kasvilajista riippuen. Täysi teho on nähtävissä 4-6 viikkoa käsittelyn jälkeen. Paras tulos saavutetaan, kun rikkakasvit ovat ruiskutusohjeella pieniä ja hyvässä kasvussa.

Älä käytä Zoral'ia kauralla tai kasvustossa, johon on aluskasviksi kylvetty palkokasveja (esim. apila) tai heinä/nurmikasveja. Ei saa sekoittaa fenokseja sisältävien rikkakasvien torjunta-aineiden kanssa (MCPA, 2,4D etc.)

Käyttömäärät ja ruiskutusajankohta hukkakauran, rikkakananhirssin ja viherpantaheinän torjunnassa:Syysviljat (ruiskutus keväällä)

- Kasvuvaiheesta BBCH 30 - 39 0,8-1,3 L/ha

Kevätiljat

- Kasvuvaiheesta BBCH 30 - 39 0,8-1,0 L/ha

Vesimäärä: Käytä ZORAL'ia sekoitettuna 100 - 400 litraan vettä hehtaaria kohti. Pienintä vesimäärää tulisi käyttää ainoastaan avoimissa kasvustoissa rikkakasvien ollessa pieniä.

Maalajit: Zoral'ia voidaan käyttää kaikilla maalajeilla.

Sateenkesto: Zoral on sateen kestävä tunnin kuluttua levityksestä.

Huomioitavaa

Vältä ruiskutusta yli 25°C lämpötiloissa.
*Älä käsittele stressaantuneita kasvustoja.
Monet tekijät, kuten halla, kuivuus, märkyys, hivenaineiden puutos, taudit ja sairaudet voivat aiheuttaa stressiä. Lieviä kasvuston yhteyttämisoireita (kloroosia, kasvun hidastumista ja vaalenemista) voi esiintyä, mutta ne ovat tilapäisiä, eivätkä ne vaikuta satoon tai sen laatuun.

Non-printed

**Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area
printed on the front page)**

Uusintakylvö

Seuraavana vuonna voidaan viljellä normaalin viljelykierron kasveja, kun Zoral on ruiskutettu ennen kasvuvaihetta BBCH 39 (korrenkasvun päättymiseen saakka), käytetty enint. 1,3 L/ha. Koska maan lämpötila ja kosteus vaikuttavat Zoral'in hajoamiseen maaperässä, Zoral'illa käsitelty pelto suositellaan kynnettäväksi ennen seuraavan kasvien kylvöä.

Mikäli käsitelty kasvusto joudutaan rikkomaan Zoral ruiskutuksen jälkeen kasvukaudella, voidaan kasvulohkolle kylvää kevytmuokattuun maahan 6 viikkoa Zoral käsittelyn jälkeen: Kevätviljaa, perunaa, palkokasveja ja maissia.

Ruiskutustekniikka

Zoral voidaan levittää traktoriruiskulla, jos se on hyvässä toimintakunnossa ja on kalibroitu valmistajan suositusten mukaisesti. Käytä mahdollisimman matalaa ruiskutuspainetta, sekä suutintyyppistä ja kasvustosta riippuvaa puomiston korkeutta, ruiskutusnesteen tasaisen leviämisen varmistamiseksi. Käytä rikkakasvien torjunta-aineen levittämiseen tarkoitettuja suuttimia.

Ruiskutusnesteen valmistus

Zoral voidaan ruiskuttaa normaalilla puomistolla varustetulla traktoriruiskulla. Zoral voidaan lisätä säiliöön joko ruiskun päältä tai erillisen syöttölaitteen avulla. Lisää haluttu Zoral määrä puolillaan vettä olevaan säiliöön, sekoita huolellisesti ja lisää puuttuvat valmisteet ja loput vedestä. Pidä sekoitus käynnissä valmisteiden lisäämisen aikana sekä ruiskutettaessa.

Ruiskun puhdistus

Huuhtele ruisku ja mittausvälineet huolellisesti ja välittömästi vedellä, ruiskutuksen jälkeen. Jotta vältytään muiden kasvien vioittumiselta, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear*) Extraa seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö välittömästi ruiskutuksen jälkeen. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtelee säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puolilleen vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö vedellä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä säiliö kokonaan.
4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuoksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 ml All Clear Extraa /10 litraa vettä.
5. Huuhtelee säiliö puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimen läpi vähintään 1/10 osa säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
6. Käytä jo käsiteltyä aluetta pesuvesien hävittämiseen. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille tai maahan, johon aiotaan kylvää arkoja kasveja.

Huom. Jos säiliötä ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Työhygieeninen varoika:

Käsittelyllä alalla kävely on kielletty, kunnes ruiskute on kuivunut kasvustoon.

Käytön rajoitukset

Pohjavesirajoitus

Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialue luokat 1 ja 2). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulee välttää.

Vesistörajoitus

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Pintavaluntaa ehkäisevä suojaetäisyys suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi monivuotista kasvillisuutta kasvavana kaistana, joka perustetaan viimeistään käsittelyä edeltävänä syksynä.

Muut ohjeet

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojelu

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet.

Suojaetäisyys käsittelyalueen ulkopuoliseen kasvillisuuteen eri suutintyypeillä				
Käyttö	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
		Vähintään		
		50 %	75 %	90 %
Kaikki käyttökohteet ja käyttömäärät	15 m	10 m	5 m	3 m

Varastointi ja säilyvyys

Luvanhaltija ilmoittaa tiedon valmisteen säilyvyydestä pakkauksen myyntipäällystekstissä.

Pakkausten ja valmisteen hävittäminen

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, ruiskuta suuttimien lävitse ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä.

Huolehdi, ettei pesuvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhdeluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Bruksanvisningar:**Besprutningsförfållanden:**

Zoral är ett bekämpningsmedel som används efter broddskjutning i höstsåd (höstvet, höstkorn, råg, spelt och rågvete) och i vårsåd (vårvete, vårkorn) för bekämpning av flyghavre, hönshirs och kavelhirs.

Zoral verkar genom ogräsens blad. I ogräs som är känsliga för Zoral börjar effekten synas några dagar eller veckor efter besprutning, beroende på växtslag. Full effekt kan ses efter 4-6 veckor efter behandling. Bästa resultat erhålls då ogräsen vid besprutningstidpunkten är små och i ett starkt växande skede.

Använd inte Zoral i havre eller i grödor där man som bottengröda har sått baljväxter (t.ex. klöver) eller hö-/vallväxter. Får inte blandas med ogräsbekämpningsmedel som innehåller fenoxysyror (MCPA, 2,4D m.fl.).

Bruksmängder och besprutningstidpunkter vid bekämpning av flyghavre, hönshirs och kavelhirs:Höstsåd (besprutning på våren)

- Fr.o.m. växtstadi BBCH 30 - 39 0,8-1,3 L/ha

Vårsåd

- Fr.o.m. växtstadi BBCH 30 - 39 0,8-1,0 L/ha

Vattenmängd: Använd Zoral blandat i 100-400 liter vatten per hektar. Liten vattenmängden borde användas enbart i öppen gröda då ogräsen är små.

Jordarter: Zoral kan användas på alla jordarter.

Regntåligt: Zoral är regntåligt en timme efter besprutning.

Att observera

Undvik besprutning i över 25°C temperatur. * Bespruta inte stressade grödor. Många faktorer såsom frost, torka, fukt, spårämnesbrist och sjukdomar kan förorsaka stress. Lindriga assimilationssymptom (kloros, tillväxthämning och ljusfärgning) kan förekomma men de är tillfälliga och de inverkar inte på skörden eller dess kvalitet.

Omsådd

Följande år kan man odla grödor enligt normal växtföljd då Zoral är besprutad före växtstadi BBCH 39 (till och med stråttillväxtens slut) och använd mängd är max. 1,3 l/ha. Eftersom jordens temperatur och fukthalt inverkar på Zoral's nedbrytning i jordmånen, rekommenderas att åker som är behandlad med Zoral plöjs före sådd av följande gröda.

Om den behandlade grödan måste brytas efter Zoral-besprutning under växtperioden, kan man på växtskiftet, 6 veckor efter Zoral-behandling, i lättbearbetad jord så: vårsåd, potatis, baljväxter och majs.

Besprutningsteknik

Zoral kan besprutas med traktorspruta, som är besiktigad samt kalibrerad enligt tillverkarens rekommendationer. Använd så lågt besprutningstryck som möjligt samt en ramphöjd som beror på munstyckstyp och grödans höjd för att säkerställa besprutningsvätskans jämna spridning. Använd munstycken som är avsedda för spridning av ogräspreparat.

Beredning av sprutvätskan

Zoral kan besprutas med traktorspruta försedd med normal ramputrustning. Zoral kan tillsättas i behållaren via påfyllningsöppningen eller sprutans påfyllningsaggregat. Tillsätt önskad mängd Zoral i en med vatten halvfyllt behållare, blanda omsorgsfullt och tillsätt resterande preparat och vatten. Håll sprutans blandare igång under påfyllning och besprutning.

Sprutans rengöring

Skölj sprutan och måttkärl omsorgsfullt och omedelbart efter besprutning med vatten. För att undvika skador på övriga växter skall sprututrustningen tvättas omsorgsfullt både ut- och invändigt med tvättmedel som är avsett för spruttvätt, t.ex. All Clear*) Extra enligt följande:

1. Töm behållaren omedelbart efter besprutning. Tvätta sprutan utvändigt med rent vatten.
2. Skölj behållaren invändigt och bespruta minst 1/10 av volymen via ramp och munstycken. Töm behållaren helt på åkern.
3. Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt behövlig mängd tvättmedel. Använd blandaren och skölj munstycken och slangar med den här tvättlösningen. Fyll behållaren med vatten och använd blandaren i 15 minuters tid. Spruta genom munstycken och töm behållaren helt.
4. Munstycken och filter avmonteras och tvättas separat i lösning som består av tvättmedel, t.ex. 50 ml All Clear Extra / 10 l vatten.
5. Skölj behållaren med rent vatten och bespruta vatten genom munstycken minst 1/10 av behållarvolymen. Töm behållaren helt på åkern.
6. Bespruta tvättvätskan på redan besprutat område. Se till att tvättvattnet inte kommer i kontakt med känsliga växter eller i marken där man tänker så känsliga växter.

Obs! Om behållaren inte kan tömmas helt skall punkt 3 upprepas före man går till punkt 4.

Skyddsutrustning

Vid hantering av produkten bör man använda gummistövlar, skyddsdräkt, kemikalieresistenta skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. Vid arbete som medför stänkrisks används dessutom ansikts-/ögonskydd. Vid arbete som exponerar andningsvägarna bör andningsskydd försett med filter P2/A2 användas.

Arbetshygienisk karenstid

Det är förbjudet att gå på det behandlade området tills sprutvätskan har torkat på växtbeståndet.

Begränsningar i användningen

Begränsning av grundvatten

Växtskyddsmedlet kan röra sig i jorden och får därför inte användas på viktiga eller på andra för vattenförsörjningen lämpade grundvattenområden (klass 1 och 2). Runt brunnar och källor som används för hushållsvatten ska lämnas en minst 30–100 meter bred skyddszon som inte behandlas med växtskyddsmedel. Användning av växtskyddsmedel på grova mojordar eller ännu grövre jordarter bör undvikas.

Vattenbegränsning

Förörena inte vatten med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsigtt väder. Sprutans påfyllningsenhet får inte användas för att fylla på en traktorburen spruta med vatten ur ett vattendrag. Överbliven besprutningslösning och sprut rengöringsmedel får inte släppas ut i vatten.

Vid besprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag skall ett skyddsavstånd på 10 meter från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Det rekommenderas att skyddsavståndet för att förhindra ytavrinning genomfördes t.ex. som växtzon för perenn växtlighet, att fastställas senast under hösten före behandlingen.

Andra anvisningar

Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet

Produkten kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet. För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan.

Skyddsavstånd till vegetation utanför behandlingsområdet med olika munstyckstyper				
Användning	Spaltmunstycke	Munstycken som minskar vindavdriften		
		Minst		
		50 %	75 %	90 %
Alla användningsområden och användningsmängder	15 m	10 m	5 m	3 m

Lagring och hållbarhet

Tillståndsinnehavare anger information om produktens hållbarhet i förpackningstext.

Förstöring an förpackningar och produkt

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel lämnas till insamlingspunkt för farligt avfall och tomma och sköljda förpackningar lämnas till avfallsstation.

Om preparatet har hunnit torka fast i sprutan, låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta ut genom munstycken och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygn (tvättmedlet löser upp fasttorkat preparat). Tvätta och skölj enligt anvisningar ovan.

Se till att tvättvätska eller sköljvatten inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

Zoral™

Arylex™ active

3 362130 208983 >

**RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/
OGRÄSMEDEL****GROUP 1 (A) HERBICIDE****GROUP 4 (O) HERBICIDE****GROUP 2 (B) HERBICIDE**

UFI: 54VE-508X-D00H-W2VM

Käyttötarkoitus: Syysviljoilla (syysvehnä, syysohra, ruis, speltti ja ruisvehnä) ja kevätilviljoilla (kevävehnä ja -ohra) hukkakauran ja rikkakananhirsin torjuntaan.

Användningsändamål: För bekämpning av flyghavre, hönshirs och kavelhirs i höstsäd (höstvet, höstkorn, råg, spelt och rågvete) och vårsäd (vårsvete och vårkorn).

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärühmä: Ammattikäyttäjät**Tehoaineet:**

Pinoksadeeni 45 g/l, 4,7 % (w/w)

Halauksifeeni-metyyli 4,82 g/l, 0,52 % (w/w)

Florasulaami 3,85 g/l, 0,4 % (w/w)

Suoja-aine:

Klokintoseetti-meksyli 11,25 g/l, 1,17 % (w/w)

Valmistetyyppi: EC

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja: Corteva Agriscience

Edustaja Suomessa: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Luvanhaltija: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamina K, Tanska.
Puh. +45 45 28 08 00

Rekisterinumero: 4106

Poikkeuslupa kasvinsuojelun hätätilanteessa 1.5.2026-28.8.2026.

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare**Verksamma ämnen:**

Pinoksadeeni 45 g/l, 4,7 % (w/w)

Halauksifeeni-metyyli 4,82 g/l, 0,52 % (w/w)

Florasulaami 3,85 g/l, 0,4 % (w/w)

Skyddsämne:

Klokintoseetti-meksyli 11,25 g/l, 1,17 % (w/w)

Preparattyp: EC

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare: Corteva Agriscience

Representant i Finland: Corteva Agriscience Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa. www.corteva.fi

Tillståndsinnehavare: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark.
Tfn. +45 45 28 08 00

Registreringsnummer: 4106

Dispens i nödsituationer på växtskyddsområdet 1.5.2026-28.8.2026